

二次剩余(QRP)

Cipolla算法(素数情况下)

[wiki百科](#)

对于 $x^2 \equiv a \pmod{p}$

可以随机找一个数 s ,
 $\text{s.t. } (\frac{s^2 - a}{p}) = -1$, 即 s 不是 p 的二次剩余,
 可以知道找到 s 的期望次数为 2

考虑 $\mathbb{Z}(w = \sqrt{s^2 - a}) = \langle j + kw \rangle$ 以及如下定理

- 普通列表项目 $w^p = w * (w^2)^{\frac{p-1}{2}} = w * (s^2 - a)^{\frac{p-1}{2}} \equiv -w \pmod{p}$
- 普通列表项目 $(a+b)^p \equiv a^p + b^p \pmod{p}$

解为 $x \equiv (s+w)^{\frac{p+1}{2}}$:

$$(s+w)^{p+1} = (s+w)^p(s+w) \equiv (s^p + w^p)(s+w) \equiv (s-w)(s+w) = (s^2 - w^2) \equiv a \pmod{p}$$

三次剩余

$x^3 \equiv a \pmod{p}$

如果 $a=0, p \leq 3$ 考虑特判

$p=3k+2$, $x \equiv a^{\frac{2p-1}{3}}$ 且为唯一解

若不为唯一解, 则说明其有 3 次单位根 $1, \alpha, \alpha^2$, 故每种解三个一组, 而 $3 \nmid p-1$ 矛盾

$p=3k+1$, 其有 3 次单位根, 且可能无解

先利用 $a^{\frac{p-1}{3}} \equiv 1 \pmod{p}$ 判断有无解

找到 $b^3 \equiv a \pmod{p}$, 则解为 $b, b\alpha, b\alpha^2$

类比二次剩余 Cipolla 算法, 设 a 的根为 $\theta \neq a$

$C = \langle j+k\theta+l\theta^2 \rangle$, 随机生成 j, k, l 得到 $y = j+k\theta+l\theta^2$

$z \equiv y^{\frac{p-1}{3}} \pmod{p}, z^3 \equiv 1 \pmod{p}$

Last update:
2020/05/16 2020-2021:teams:alchemist:hardict:qrp https://wiki.cvbbacm.com/doku.php?id=2020-2021:teams:alchemist:hardict:qrp&rev=1589616557
16:09

From:
<https://wiki.cvbbacm.com/> - **CVBB ACM Team**

Permanent link:
<https://wiki.cvbbacm.com/doku.php?id=2020-2021:teams:alchemist:hardict:qrp&rev=1589616557>

Last update: **2020/05/16 16:09**

