莫比乌斯反演技巧总结

常用狄利克雷卷积

- $\epsilon = \mu * 1$□证明：二项式定理$(1 - 1)^2 = 0$。
- $\operatorname{id} = \varphi * 1$□证明：真分数约分。
- $\varphi= \mu * \operatorname{id}$□证明：上面式子左右卷$\mu$□

常用套路

- 求 $$\sum_{i=1}^{n}\sum_{j=1}^{m}\gcd(i,j)$$ 先枚举$d = \gcd(i,j)$□再套用$\epsilon = \mu * 1$ $$=\sum_{d=1}^{n}d\sum_{i=1}^{\left\lfloor \frac{n}{d} \right\rfloor}\sum_{j=1}^{\left\lfloor \frac{m}{d} \right\rfloor}[\gcd(i,j)=1]$$ $$=\sum_{d=1}^{n}d\sum_{i=1}^{\left\lfloor \frac{n}{d} \right\rfloor}\sum_{j=1}^{\left\lfloor \frac{m}{d} \right\rfloor}\sum_{p|\gcd(i,j)}\mu(p)$$ 再枚举p $$=\sum_{d=1}^{n}d\sum_{p=1}^{\left\lfloor \frac{n}{d} \right\rfloor}\mu(p)\sum_{i=1}^{\left\lfloor \frac{n}{dp} \right\rfloor}\sum_{j=1}^{\left\lfloor \frac{m}{dp} \right\rfloor}1$$ $$=\sum_{d=1}^{n}d\sum_{p=1}^{\left\lfloor \frac{n}{d} \right\rfloor}\mu(p)\frac{\left\lfloor \frac{n}{dp} \right\rfloor(\left\lfloor \frac{n}{dp} \right\rfloor + 1)\left\lfloor \frac{m}{dp} \right\rfloor(\left\lfloor \frac{m}{dp} \right\rfloor + 1)}{4}$$ 设$T=dp$□枚举T $$=\sum_{T=1}^{n} \frac{\left\lfloor \frac{n}{T} \right\rfloor(\left\lfloor \frac{n}{T} \right\rfloor + 1)\left\lfloor \frac{m}{T} \right\rfloor(\left\lfloor \frac{m}{T} \right\rfloor + 1)}{4}\sum_{d|T}d\mu(\frac{T}{d})$$ 套用$\varphi= \mu * \operatorname{id}$ $$=\sum_{T=1}^{n} \frac{\left\lfloor \frac{n}{T} \right\rfloor(\left\lfloor \frac{n}{T} \right\rfloor + 1)\left\lfloor \frac{m}{T} \right\rfloor(\left\lfloor \frac{m}{T} \right\rfloor + 1)}{4}\varphi(T)$$ 求出欧拉函数前缀和，直接整除分块即可。

- 上述过程中最为关键的是设$T=dp$□枚举T这一步。该操作可以概括为如下等式□$$\sum_{d=1}^{n}f(d)\sum_{p=1}^{\left\lfloor \frac{n}{d} \right\rfloor}g(p)h(dp)=\sum_{T=1}^{n}h(T)\sum_{d|T}f(d)g(\frac{T}{d})$$设$F(n)=\sum_{d|n}f(d)g(\frac{n}{d})$□则原式可化为$$\sum_{T=1}^{n}h(T)F(T)$$如果两个函数一个可以整除分块，另一个可以在合理时限内求出前缀和，那么就可以以较低时间复杂度求出答案。

- 结论□$$\sum_{i=1}^ni[\gcd(i,n)=1]=\frac{n\varphi(n)+[n=1]}{2}$$ 证明如下□$$\sum_{i=1}^ni[\gcd(i,n)=1]$$ 套用$\epsilon = \mu * 1$ $$=\sum_{i=1}^ni\sum_{d|\gcd(i,n)}\mu(d)$$ 枚举d□注意这里n是已知量，只需枚举$d|n$ $$=\sum_{d|n}\mu(d)d\sum_{i=1}^{\frac{n}{d}}i$$ $$=\frac{1}{2}\sum_{d|n}\mu(d)d\frac{n}{d} (\frac{n}{d} + 1)$$ $$=\frac{n}{2}\sum_{d|n}\mu(d)(\frac{n}{d} + 1)$$ $$=\frac{n}{2}(\sum_{d|n}\mu(d)\frac{n}{d}+\sum_{d|n}\mu(d))$$ 由$\varphi= \mu * \operatorname{id}$和$\epsilon = \mu * 1$可得$$=\frac{n}{2}(\varphi(n)+[n=1])$$ $$=\frac{n\varphi(n)+n[n=1]}{2}$$ $$=\frac{n\varphi(n)+[n=1]}{2}$$