

# 比赛名称

[比赛链接](#)

**A.**

upsolved by

题意

题解

**B.**

upsolved by

题意

题解

**C.**

upsolved by

题意

题解

**D.**

solved by JJLeo

题意

给定  $t, a, c, m$  等概率地从  $[0, t]$  中选择两个数  $v_1, v_2$  设  $X_0 = v_1 + v_2$   $X_{n+1} = (aX_n + c) \pmod m$  ( $n \geq 0$ ) 求  $X_{|v_1 - v_2|}$  是偶数的期望，输出最简分数 ( $2 \leq m \leq 10^6, 0 \leq a, c < m, 0 \leq t < \frac{m}{2}$ )

## 题解

可以发现 $X$ 数组本质上是多个环，因此我们可以考虑当 $v_1+v_2=b$ 时， $|v_1-v_2|$ 的取值情况，分奇偶以及 $v_1+v_2$ 与 $t$ 的大小关系讨论一下可以发现本质上就是求环上某个点往后两个两个跳遇到的所有点其中是偶数的数量，倍增处理一下即可，本题难点在上述讨论过程中细节上的一些处理。

## E.

upsolved by JJLeo

题意

题解

## F.

upsolved by

题意

题解

## G.

upsolved by

题意

题解

## H.

upsolved by JJLeo

题意

题解

# I.

solved by 2sozx JJLeo

## 题意

给出一个长度为  $n$  的排列的最长上升子序列与最长下降子序列的长度  $x, y$  找出一个符合条件的序列，并且要求字典序最小，没有则输出  $-1$  ( $n \leq 10^5$ )

## 题解

字典序最小显然将  $1, 2, 3, \dots$  放在前面，后面考虑将最长下降子序列分块，每块的长度为  $y$  若存在不整除的情况则在  $1, 2, 3, \dots$  后先输出字典序最小。如果  $x + y > n + 1$  一定不存在输出  $-1$  即可。

# J.

solved by JJLeo

## 题意

定义所有横纵坐标不互质的点为“好点”，现在初始在一个好点上，每次可以不动或者前往周围八个格子中的好点，上述操作均等概率随机，设走  $p_t$  为游走  $t$  次后回到初始点的概率，求  $\lim_{t \rightarrow +\infty} p_t$

## 题解

如果能走到对角线答案为  $0$ ，否则盲猜好点的个数不会很多，因此直接爆搜，再观察样例盲猜出答案为“起点可移动的方向（包括不动）”除以“所有点可移动的方向（包括不动）之和”。而这样做的正确性，题解如是说：至于证明极限的存在性，需要涉及关于邻接矩阵的特征值等内容，可以自行查阅“图上随机游走”相关书籍文献。

# 记录

before 提前获得了本场比赛会PE的消息  
0min 分题  
20+min ZYF MJX 冲!  
30min MJX AC CSK 冲G ZYF MJX 看  
58min CSK WA ZYF 冲J  
72min ZYF WA  
76min 多输出个换行 AC J CSK AC G 冲D  
128min ZYF AC D  
till end 垃圾时间比以往来得更早一些

after end 垃圾hdu测评机

## 总结

- MJX 考试前一天早点睡，以免太困
- ZYF 啥也不会，我学还不行吗。（但为什么某卷翻天的题会无限TLE

From: <https://wiki.cvbbacm.com/> - CVBB ACM Team

Permanent link: [https://wiki.cvbbacm.com/doku.php?id=2020-2021:teams:farmer\\_john:2020hdu%E6%9A%91%E6%9C%9F%E5%A4%9A%E6%A0%A1%E7%AC%AC%E4%B8%83%E5%9C%BA&rev=1597999944](https://wiki.cvbbacm.com/doku.php?id=2020-2021:teams:farmer_john:2020hdu%E6%9A%91%E6%9C%9F%E5%A4%9A%E6%A0%A1%E7%AC%AC%E4%B8%83%E5%9C%BA&rev=1597999944)

Last update: 2020/08/21 16:52