

知识点

前言

对于一元函数的极值问题相信大家都十分熟悉，但是对于多元函数的极值问题可能就会比较陌生。大家都学过淑芬怎么可能陌生呢

对于没有限制条件的多元函数来说，只需要对函数求导即可，但是若有了限制条件，即函数的值要在一定条件下才能取到，则需要用到拉格朗日乘子法。

前置知识

多元函数的求导

多元函数极值的概念

二次型矩阵

引理

设函数 $f(\vec{x})$

$\|\vec{\varphi}(\vec{x})\|(\vec{x}) = (\|\varphi_1(\vec{x})\|, \|\varphi_2(\vec{x})\|, \dots, \|\varphi_m(\vec{x})\|)$ 在区域 $D \subset \mathbb{R}^n$ ($m < n$) 内具有各个连续偏导数，再设

$\|\vec{x}_0\| = (x_1^0, x_2^0, \dots, x_n^0) \in D$ 为 $f(\vec{x})$ 在约束条件

$\begin{cases} \varphi_1(\vec{x}) = 0 \\ \varphi_2(\vec{x}) = 0 \\ \dots \\ \varphi_m(\vec{x}) = 0 \end{cases}$

下的极值点，并且 $\varphi'(\vec{x}_0)$ 的秩为 m 则存在常数 $\lambda_1, \lambda_2, \dots, \lambda_3 \in \mathbb{R}$ 使得在 \vec{x}_0 处成立下述等式 $\begin{cases} \frac{\partial f(\vec{x}_0)}{\partial x_i} + \sum_{j=1}^m \lambda_j \frac{\partial \varphi_j(\vec{x}_0)}{\partial x_i} = 0 \quad (i=1, 2, \dots, n) \\ \varphi_j(\vec{x}_0) = 0 \quad (j=1, 2, \dots, m) \end{cases}$

证明

由于 $\varphi'(\vec{x}_0)$ 的秩为 m 我们不妨设行列

$\begin{cases} \frac{\partial \varphi_1}{\partial x_1}, \frac{\partial \varphi_1}{\partial x_2}, \dots, \frac{\partial \varphi_1}{\partial x_n} \\ \frac{\partial \varphi_2}{\partial x_1}, \frac{\partial \varphi_2}{\partial x_2}, \dots, \frac{\partial \varphi_2}{\partial x_n} \\ \dots \\ \frac{\partial \varphi_m}{\partial x_1}, \frac{\partial \varphi_m}{\partial x_2}, \dots, \frac{\partial \varphi_m}{\partial x_n} \end{cases}$ 在 \vec{x}_0 处不为零。因此，在 \vec{x}_0 的某个邻域内唯一确定一组具有各个连续偏导数的隐函

数 $\begin{cases} x_{n-m+1} = g_1(x_1, x_2, \dots, x_{n-m}), \\ x_{n-m+2} = g_2(x_1, x_2, \dots, x_{n-m}), \\ \dots \\ x_n = g_m(x_1, x_2, \dots, x_{n-m}) \end{cases}$ 满足

$x_j = g_j(x_1^0, x_2^0, \dots, x_n^0) \quad (j=n-m+1, n-m+2, \dots, n)$ 且有 $\varphi_k(x_1^0, x_2^0, \dots, x_n^0) = 0 \quad (k=1, 2, \dots, m)$ 将隐函数组代入 $f(\vec{x}_0)$

得 $f(x_1^0, x_2^0, \dots, x_n^0) = f(g_1(x_1^0, x_2^0, \dots, x_n^0), g_2(x_1^0, x_2^0, \dots, x_n^0), \dots, g_m(x_1^0, x_2^0, \dots, x_n^0))$ 因此 \vec{x}_0 是条件极值点转化为 $(x_1^0, x_2^0, \dots, x_n^0)$ 为上述函数的通常极值点。

令 \vec{x}_0' 则对 $i=1, 2, \dots, n-m$

有 $\frac{\partial f(\vec{x}_0)}{\partial x_i} + \frac{\partial f(\vec{x}_0)}{\partial x_{n-m+1}} + \dots + \frac{\partial f(\vec{x}_0)}{\partial x_n} = 0$ 令

$\vec{g}(\vec{x}) = (g_1(\vec{x}), g_2(\vec{x}), \dots, g_m(\vec{x}))$ 其中

$\vec{g}'(\vec{x}) = (g_1'(\vec{x}), g_2'(\vec{x}), \dots, g_m'(\vec{x}))$ 将上述 $n-m$ 个等式写成向量形式，

有 $\left(\frac{\partial f(\vec{x}_0)}{\partial x_1}, \frac{\partial f(\vec{x}_0)}{\partial x_2}, \dots, \frac{\partial f(\vec{x}_0)}{\partial x_n} \right)' = \vec{g}'(\vec{x}_0)$

拉格朗日乘子法

构造函数 $F(x_1, \dots, x_n, \lambda_1, \dots, \lambda_m) = f(\vec{x}) + \sum_{j=1}^m \lambda_j \varphi_j(\vec{x})$ 则上述求条件极值点的必要条件形式转化为 F 的通常极值的必要条件
\$\$\begin{cases} \frac{\partial F(\vec{x}_0)}{\partial x_i} = 0 \quad (i=1, 2, \dots, n) \\ \frac{\partial F(\vec{x}_0)}{\partial \lambda_j} = 0 \quad (j=1, 2, \dots, m) \end{cases} 此即拉格朗日乘子法

From:

<https://wiki.cvbbacm.com/> - CVBB ACM Team

Permanent link:

https://wiki.cvbbacm.com/doku.php?id=2020-2021:teams:farmer_john:2sozx:%E6%95%B0%E5%AD%A6:%E7%9F%A5%E8%AF%86%E7%82%B9&rev=1589527576

Last update: 2020/05/15 15:26