

# 知识点

## 前言

对于一元函数的极值问题相信大家都十分熟悉，但是对于多元函数的极值问题可能就会比较陌生。大家都学过淑芬怎么可能陌生呢

对于没有限制条件的多元函数来说，只需要对函数求导即可，但是若有了限制条件，即函数的值要在一定条件下才能取到，则需要用到拉格朗日乘子法。

## 前置知识

- 多元函数的求导
- 多元函数极值的概念
- 二次型矩阵

## 引理

设函数  $f(\vec{x})$

$\varphi(\vec{x})=(\varphi_1(\vec{x}),\varphi_2(\vec{x}),\dots,\varphi_m(\vec{x}))$

在区域  $D\subset \mathbb{R}^n (m<n)$  内具有各个连续偏导数，再设

$\vec{x}_0=(x_1^0,x_2^0,\dots,x_n^0)\in D$  为  $f(\vec{x})$  在约束条件

$$\begin{cases} \varphi_1(\vec{x})=0 \\ \varphi_2(\vec{x})=0 \\ \dots \\ \varphi_m(\vec{x})=0 \end{cases}$$

下的极值点，并且  $\varphi'(x_0)$  的秩为  $m$  则存在

常数  $\lambda_1,\lambda_2,\dots,\lambda_3\in\mathbb{R}$  使得在  $\vec{x}_0$  处成立下述

$$\begin{cases} \frac{\partial f(\vec{x}_0)}{\partial x_i}+\sum_{j=1}^m \lambda_j \frac{\partial \varphi_j(\vec{x}_0)}{\partial x_i}=0 \quad (i=1,2,\dots,n) \\ \varphi_j(\vec{x}_0)=0 \quad (j=1,2,\dots,m) \end{cases}$$

## 证明

由于  $\varphi'(\vec{x}_0)$  的秩为  $m$  我们不妨设行列

式  $\frac{\partial(\varphi_1,\varphi_2,\dots,\varphi_m)}{\partial(x_{n-m+1},x_{n-m+2},\dots,x_n)}$  在

$x_0$  处不为零。因此，在  $\vec{x}_0$  的某个邻域内唯一确定一组具有各个连续偏导数的隐函

数  $\begin{cases} x_{n-m+1}=g_1(x_1,x_2,\dots,x_{n-m}), \\ x_{n-m+2}=g_2(x_1,x_2,\dots,x_{n-m}), \\ \dots \\ x_n=g_m(x_1,x_2,\dots,x_{n-m}) \end{cases}$  满足

$x_j^0=g_j(x_1^0,x_2^0,\dots,x_n^0) (j=n-m+1,n-m+2,\dots,n)$  且有  $\varphi_k(x_1,\dots,x_{n-m},g_1(x_1,x_2,\dots,x_{n-m}),\dots,g_m(x_1,x_2,\dots,x_{n-m}))=0$  将隐函数组代入  $f(\vec{x}_0)$

得  $f(x_1,\dots,x_{n-m},g_1(x_1,x_2,\dots,x_{n-m}),\dots,g_m(x_1,x_2,\dots,x_{n-m}))$  因此  $\vec{x}_0$  是

条件极值点转化为  $(x_1^0,x_2^0,\dots,x_{n-m}^0)$  为上述函数的通常极值点。

令  $\vec{x}_0'$  则对  $i=1,2,\dots,n-m$

有  $\frac{\partial f(\vec{x}_0')}{\partial x_i}+\frac{\partial f(\vec{x}_0')}{\partial x_{n-m+1}}\cdots+\frac{\partial f(\vec{x}_0')}{\partial x_n}+\frac{\partial g_1(\vec{x}_0')}{\partial x_i}+\dots+\frac{\partial f(\vec{x}_0')}{\partial x_{n-m+1}}\cdots+\frac{\partial f(\vec{x}_0')}{\partial x_n}\frac{\partial g_m(\vec{x}_0')}{\partial x_i}=0$  令

$\vec{g}(\vec{x})=(g_1(\vec{x}),g_2(\vec{x}),\dots,g_m(\vec{x}))^T$  其中

$\vec{x}=(x_1,x_2,\dots,x_{n-m})$  将上述  $n-m$  个等式写成向量形式，

有  $\left(\frac{\partial f(\vec{x}_0')}{\partial x_1},\dots,\frac{\partial f(\vec{x}_0')}{\partial x_{n-m}}\right)$

$$m\}}\right)+\left(\frac{\partial f(\vec{x}_0)}{\partial x_{n-m+1}}\right),\dots,\frac{\partial f(\vec{x}_0)}{\partial x_n}\right)\vec{g}(\vec{x}_0)'=0\quad \left(1\right)$$
 由于 $\vec{g}(\vec{x}_0)'=-\left(\begin{array}{c} \frac{\partial \varphi_1(\vec{x}_0)}{\partial x_{n-m+1}} & \frac{\partial \varphi_1(\vec{x}_0)}{\partial x_{n-m+2}} & \cdots & \frac{\partial \varphi_1(\vec{x}_0)}{\partial x_n} \\ \frac{\partial \varphi_2(\vec{x}_0)}{\partial x_{n-m+1}} & \frac{\partial \varphi_2(\vec{x}_0)}{\partial x_{n-m+2}} & \cdots & \frac{\partial \varphi_2(\vec{x}_0)}{\partial x_n} \\ \vdots & \vdots & \ddots & \vdots \\ \frac{\partial \varphi_m(\vec{x}_0)}{\partial x_{n-m+1}} & \frac{\partial \varphi_m(\vec{x}_0)}{\partial x_{n-m+2}} & \cdots & \frac{\partial \varphi_m(\vec{x}_0)}{\partial x_n} \end{array}\right)^{-1} \left(\begin{array}{c} \frac{\partial \varphi_1(\vec{x}_0)}{\partial x_1} & \frac{\partial \varphi_1(\vec{x}_0)}{\partial x_2} & \cdots & \frac{\partial \varphi_1(\vec{x}_0)}{\partial x_{n-m}} \\ \frac{\partial \varphi_2(\vec{x}_0)}{\partial x_1} & \frac{\partial \varphi_2(\vec{x}_0)}{\partial x_2} & \cdots & \frac{\partial \varphi_2(\vec{x}_0)}{\partial x_{n-m}} \\ \vdots & \vdots & \ddots & \vdots \\ \frac{\partial \varphi_m(\vec{x}_0)}{\partial x_1} & \frac{\partial \varphi_m(\vec{x}_0)}{\partial x_2} & \cdots & \frac{\partial \varphi_m(\vec{x}_0)}{\partial x_{n-m}} \end{array}\right)^{-1} \triangleq -A^{-1}B\quad \left(2\right)$ 
 注意到 $-\left(\frac{\partial f(\vec{x}_0)}{\partial x_{n-m+1}}\right),\dots,\frac{\partial f(\vec{x}_0)}{\partial x_n}\right)\cdot A^{-1}$ 是一个 $m$ 维行向量，我们可以将其记为 $-\left(\frac{\partial f(\vec{x}_0)}{\partial x_{n-m+1}}\right),\dots,\frac{\partial f(\vec{x}_0)}{\partial x_n}\right)\cdot A^{-1}=\left(\lambda_1,\lambda_2,\dots,\lambda_m\right)\quad \left(3\right)$ 
 将 $\left(2\right),\left(3\right)$ 代入之前的式子 $\left(1\right)$ 得
 
$$\left(\frac{\partial f(\vec{x}_0)}{\partial x_1},\dots,\frac{\partial f(\vec{x}_0)}{\partial x_{n-m}}\right)+\left(\lambda_1,\lambda_2,\dots,\lambda_m\right)\left(\begin{array}{c} \frac{\partial \varphi_1(\vec{x}_0)}{\partial x_1} & \frac{\partial \varphi_1(\vec{x}_0)}{\partial x_2} & \cdots & \frac{\partial \varphi_1(\vec{x}_0)}{\partial x_{n-m}} \\ \frac{\partial \varphi_2(\vec{x}_0)}{\partial x_1} & \frac{\partial \varphi_2(\vec{x}_0)}{\partial x_2} & \cdots & \frac{\partial \varphi_2(\vec{x}_0)}{\partial x_{n-m}} \\ \vdots & \vdots & \ddots & \vdots \\ \frac{\partial \varphi_m(\vec{x}_0)}{\partial x_1} & \frac{\partial \varphi_m(\vec{x}_0)}{\partial x_2} & \cdots & \frac{\partial \varphi_m(\vec{x}_0)}{\partial x_{n-m}} \end{array}\right)=0\quad \left(4\right)$$
 另外我们可以将 $\left(3\right)$ 改写成 $\left(\frac{\partial f(\vec{x}_0)}{\partial x_{n-m+1}}\right),\dots,\frac{\partial f(\vec{x}_0)}{\partial x_n}\right)+\left(\lambda_1,\lambda_2,\dots,\lambda_m\right)\left(\begin{array}{c} \frac{\partial \varphi_1(\vec{x}_0)}{\partial x_{n-m+1}} & \frac{\partial \varphi_1(\vec{x}_0)}{\partial x_{n-m+2}} & \cdots & \frac{\partial \varphi_1(\vec{x}_0)}{\partial x_n} \\ \frac{\partial \varphi_2(\vec{x}_0)}{\partial x_{n-m+1}} & \frac{\partial \varphi_2(\vec{x}_0)}{\partial x_{n-m+2}} & \cdots & \frac{\partial \varphi_2(\vec{x}_0)}{\partial x_n} \\ \vdots & \vdots & \ddots & \vdots \\ \frac{\partial \varphi_m(\vec{x}_0)}{\partial x_{n-m+1}} & \frac{\partial \varphi_m(\vec{x}_0)}{\partial x_{n-m+2}} & \cdots & \frac{\partial \varphi_m(\vec{x}_0)}{\partial x_n} \end{array}\right)=0\quad \left(5\right)$ 
 将 $\left(4\right),\left(5\right)$ 写成分量形式再加上约束条件即可证明。

## 拉格朗日乘子法

构造函数  $F(x_1, \dots, x_n, \lambda_1, \dots, \lambda_m) = f(\vec{x}) + \sum_{j=1}^m \lambda_j \varphi_j(\vec{x})$  则上述求条件极值点的必要条件形式转化为  $F$  的通常极值的必要条件

$$\begin{cases} \frac{\partial F(\vec{x}_0)}{\partial x_i} = 0 \quad (i=1, 2, \dots, n) \\ \frac{\partial F(\vec{x}_0)}{\partial \lambda_j} = 0 \quad (j=1, 2, \dots, m) \end{cases}$$

此即拉格朗日乘子法

From:

<https://wiki.cvbbacm.com/> - CVBB ACM Team

Permanent link:

[https://wiki.cvbbacm.com/doku.php?id=2020-2021:teams:farmer\\_john:2sozx:%E6%95%B0%E5%AD%A6:%E7%9F%A5%E8%AF%86%E7%82%B9&rev=1589527576](https://wiki.cvbbacm.com/doku.php?id=2020-2021:teams:farmer_john:2sozx:%E6%95%B0%E5%AD%A6:%E7%9F%A5%E8%AF%86%E7%82%B9&rev=1589527576)

Last update: 2020/05/15 15:26