

2020牛客暑期多校训练营（第三场）

[比赛链接](#)

A - Clam and Fish

Solved by nikkukun & Potassium & qxforever.

题目描述

有 $n \leq 2 \times 10^6$ 个池塘，每个池塘里有蛤和鱼（可能都有，可能都没有，可能不都有）。依次经过所有池塘，每个池塘可以：

1. 有鱼，抓一条鱼
2. 有蛤，抓一个蛤，鱼饵 +1
3. 可能没有鱼，但必能鱼饵 -1 来抓一条鱼
4. 摸鱼

求最多能抓的鱼。

解题思路

显然有鱼时一定抓鱼，于是变成决策仅有蛤的时候是抓蛤还是抓鱼。考虑每个仅有蛤的位置贪心与其之后的空池塘匹配，剩余的仅有蛤的位置贪心匹配即可。

B - Classical String Problem

Solved by qxforever.

题目描述

给一个长度 n 的字符串 s 次操作

- 将最左边 x 个字符移到最右边或将最右边的字符移到最左边
- 询问下标 x 对应的字符

解题思路

第一种操作相当于移动字符串起始位置的下标。维护这个下标即可。

C - Operation Love

Solved by qxforever.

题目描述

给定一个多边形，表示右手的形状。有 t 组询问，每组询问给 20 个点，判断这些点形成的是右手还是左手。

解题思路

比赛时没细想，直接当成判断两个多边形是否全等做了。枚举起点，依次判断角度及边长 $O(n^2)$ 可以 hash + kmp 做到 $O(n)$

其实因为给定的一定是左手或者右手，只需要判断最长边的下一条边的长度。

E - Two Matchings

Solved by qxforever & nikkukun.

题目描述

给一个长度 $n \leq 2 \times 10^5$ 的数组 a_1, a_2, \dots, a_n 元素范围在 $[0, 10^9]$ 且 n 为偶数。对 $1 \sim n$ 的数两两匹配，你需要给出两种匹配方案，满足两种方案中不存在相同的匹配，并最小化

$$\sum_{i=1}^n |a_i - a_{p(i)}| + \sum_{i=1}^n |a_i - a_{q(i)}|$$

其中 $p(i)$ 和 $q(i)$ 依次表示 a_i 在两次匹配中匹配的下标，且 $p(i) \neq i, p(p(i)) = i$

解题思路

【留给 qxforever 的部分】

F - Fraction Construction Problem

Solved by nikkukun & Potassium & qxforever.

题目描述

10^5 次给出 $a, b \leq 2 \times 10^6$ 寻找正整数 c, d, e, f 满足：

1. $\frac{cd}{ef} = \frac{ab}{b}$
2. 两个分数分母小于 b
3. 两个分数分子不超过 4×10^{12}

或说明无解。

解题思路

先考虑 $(a, b) \neq 1$ 的情况，并令 $a' = \frac{a}{(a, b)}, b' = \frac{b}{(a, b)}$ 显然有 $\frac{a'+1}{b'} - \frac{1}{b'} = \frac{ab}{b^2}$ 于是只用考虑 $(a, b) = 1$ 的情况。

发现将式子通分后，分母很像二元一次方程的形式，为了有解应当尽可能让 $(d, f) = 1$ 因此如果能找到互质的 d, f 满足 $df = b$ 则分母的方程 $cf - de = a$ 必然有解，且最小正整数解在 $\text{lcm}(d, f)$ 内。这个互质的数可以在线筛过程中用其最小质因数的幂处理。

特殊地，如果 $b = p^k$ 是一个质数的幂，则可以取 $d = p, f = p^{k-1}$ 只不过此时需要特判一下 $p \mid a$ 是否成立，其他地方同上。最后再判一下 $b = 1$ 时无解即可。

L - Problem L is the Only Lovely Problem

Solved by nikkukun.

水题不表。

From:

<https://wiki.cvbbacm.com/> - CVBB ACM Team

Permanent link:

https://wiki.cvbbacm.com/doku.php?id=2020-2021:teams:i_dont_know_png:multi2020-nowcoder-3&rev=1595139247

Last update: 2020/07/19 14:14