Contest Info

date: 2020.06.14 13:00-18:00

practice link

Solutions

C. Coefficient

题目大意：给定函数 $f(x)=\frac{b}{c+e^{ax+d}}(a\neq0)$，求其在 $x_{0}=-\frac{d}{a}$ 处泰勒展开第 n 项 $(x-x_{0})^{n}$ 的系数。答案对 $998,244,353$ 取模。具体地说，给定一个 n，你需要回答 q 组询问，每次给出不同的 a,b,c,d 让你求答案。其中 $n,q\le5\times10^{4}$，$\sum n,\sum q\le3\times10^{5}$。

题解：令 $t=ax+d$，那么 $f(t)=\frac{b}{c+e^{t}}$，故 $f(x)$ 的泰勒展开为 $f(x)=\sum_{i=0}^{+\infty}\frac{f^{(i)}(t)t^{i}}{i!}=\frac{a^{i}f^{(i)}(t)(x-x_{0})^{i}}{i!}$，所求系数即为 $a^{n}\frac{f^{(n)}(t)}{n!}$，也就是 $f(t)$ 的展开乘以 a^{n}。

首先讨论几种特殊情况。

- 若 $n=0$，那么系数为 $\frac{b}{c+1}$，其中 $c=-1$ 时未定义。
- 否则，若 $c=-1$，那么 $f(t)=\frac{b}{-1+e^{t}}$，同样可以证明其各阶导数均未定义。
- 否则，若 $c=0$，那么 $f(t)=\frac{b}{e^{t}}$，t^{n} 项系数为 $\frac{(-1)^{n}b}{n!}$。

接下来讨论一般情况。

$$ \begin{aligned} f(t)&=\frac{b}{c+e^{t}}\\ &=\frac{b}{c}\cdot\frac{1}{1-(-\frac{1}{c})e^{t}}\\ &=\frac{b}{c}\sum_{i=0}^{+\infty}(-\frac{1}{c})^{i}e^{it}\\ \end{aligned} $$

其 t^{n} 项系数为

$$ \begin{aligned} &\frac{b}{c}\sum_{i=0}^{+\infty}(-\frac{1}{c})^{i}\frac{i^{n}}{n!}\\ =&\frac{b}{cn!}\sum_{i=0}^{+\infty}u^{i}i^{n}\\ \end{aligned} $$

这时便可用上这里介绍的技巧求 $\sum_{i=0}^{+\infty}u^{i}i^{n}$，由于 $\lim\limits_{m\to\infty}u^{m}F(m)=0$，因而答案的极限为 $-F(0)$，令 $F(0)=x$，可得方程

$$ \begin{aligned} &\sum_{i=0}^{n+1}(-1)^{i}{n+1\choose i}\frac{f(i)+x}{u^{i}}\\ =&(\frac{u-1}{u})^{n+1}x+\sum_{i=1}^{n+1}u^{i}i^{n}\sum_{j=i}^{n+1}\frac{(-1)^{j}{n+1\choose j}}{u^{j}}\\ =&(\frac{u-1}{u})^{n+1}x+\sum_{i=1}^{n+1}i^{n}\sum_{j=i}^{n+1}\frac{(-1)^{j}{n+1\choose j}}{u^{j-i}}\\ =&(\frac{u-1}{u})^{n+1}x+\sum_{i=0}^{n}\frac{1}{u^{i}}\sum_{j=i}^{n+1}(-1)^{j}{n+1\choose j}(j-i)^{n}\\ =&0\\ \end{aligned} $$

注意到常数项是关于 $\frac{1}{u}$ 的多项式，那么可以在 $\mathcal{O}(n\log^{2}n)$ 多点求值求出所有常数项。

From:
https://wiki.cvbbacm.com/ - **CVBB ACM Team**

Permanent link:
https://wiki.cvbbacm.com/doku.php?id=2020-2021:teams:intrepidsword:2019-hdu-multi-2&rev=1592157725

Last update: **2020/06/15 02:02**