Contest Info

date: 2021.01.23 ??:??-??:??

practice link

Solutions

B. Lady Layton and Stone Game

题目大意：有若干堆石子，每次可以取若干堆合并在一起，代价为合并后堆的大小。但是，堆数必须在 L 和 R 之间。求最小代价。

题解：显然每次合并时都会取最小的那几堆。假设两次相邻的合并分别取了 x 堆和 y 堆，若 $x>y$ 或 $x\le y$ 但是 $x-1$ 和 $y+1$ 合法，那么可以证明交换 x,y 或者 $x-1,y+1$ 这样合并一定更优：

- 若 $\sum_{i=1}^{x}a_{i}\le a_{x+y}$ 那么前者代价为 $\sum_{i=1}^{x}a_{i}+\sum_{i=1}^{x+y-1}a_{i}$ 后者代价为 $\sum_{i=1}^{x-1}a_{i}+\sum_{i=1}^{x+y-1}a_{i}$ 此后两个序列变得相同。因此 $x-1,y+1$ 更优。
- 否则，若 $\sum_{i=1}^{x-1}a_{i}\le a_{x+y}$ 那么前者合并再次的代价为 $\sum_{i=1}^{x}a_{i}+\sum_{i=x+1}^{x+y}a_{i}$ 后者合并两次代价为 $\sum_{i=1}^{x-1}a_{i}+\sum_{i=1}^{x+y-1}a_{i}$ 后者代价更小。而合并完成之后，前者得到了 $\sum_{i=1}^{x}a_{i}$ 与 $\sum_{i=x+1}^{x+y}a_{i}$ 后者得到了 $\sum_{i=1}^{x+y-1}a_{i}$ 与 a_{x+y} 由于 $a_{x+y}<\sum_{i=1}^{x}a_{i}$ 且 $a_{x+y}\le\sum_{i=x+1}^{x+y}a_{i}$ 因此后者的序列前缀和总是小于前者。可以证明在这一前提下，在任意的合并树下，后者的代价总比前者要优。因此 $x-1,y+1$ 更优。
- 否则，即 $\sum_{i=1}^{x-1}a_{i}>a_{x+y}$ 那么前者合并再次的代价为 $\sum_{i=1}^{x}a_{i}+\sum_{i=x+1}^{x+y}a_{i}$ 后者合并两次代价为 $\sum_{i=1}^{x-1}a_{i}+\sum_{i=x}^{x+y}a_{i}$ 两者相同。而合并完成之后，前者得到了 $\sum_{i=1}^{x}a_{i}$ 与 $\sum_{i=x+1}^{x+y}a_{i}$ 后者得到了 $\sum_{i=1}^{x-1}a_{i}$ 与 $\sum_{i=x}^{x+y}a_{i}$ 若 $x\le y$ 显然 $\sum_{i=1}^{x-1}a_{i}\le\sum_{i=1}^{x}a_{i}$ 且 $\sum_{i=1}^{x-1}a_{i}\le\sum_{i=x+1}^{x+y}a_{i}$ 与上一种情况相同。而若 $x>y$ 考虑交换 x,y 并且不妨钦定第二种情况先合并成 $\sum_{i=1}^{y}a_{i}$ 与 $\sum_{i=y+1}^{x+y}a_{i}$ 容易证明这样还是更优。

因此合并的过程一定可以表示成 $L,L,L,\ldots,L,t,R,R,R,\ldots,R$ 考虑两个序列 A 和 B 其中 B 的 R 更多/L 更少。显然可以从 A 通过一些 $-1/+1$ 操作得到 B B 更优。

确定序列后，可以用一个队列直接暴力模拟，老题了。

K. Game on a Circle

题目大意：有 n 颗石子排成一个环，从石子 1 开始遍历，每遇到一颗石子，有 p 的概率把它删除。对于石子 c 问它第 $1,2,\ldots,n$ 个被删除的概率。

题解：先讲一个等下要用的式子。令 $x=(1-p)^{t}$ 那么

$$ \begin{aligned} &\sum_{t=0}^{+\infty}x^{e}\\ =&\sum_{t=0}^{+\infty}\left((1-p)^{e}\right)^{t}\\ =&\frac{1}{1-(1-p)^{e}} \end{aligned} $$

找到一个很妙的做法。考虑容斥，设 f_{i} 表示 c 后面恰有 i 个石子的概率，那么

$$ \begin{aligned} f_{i}=\sum_{|T|\ge i,T\in\{1,2,\ldots,n\}-\{c\}}(-1)^{|T|-i}{|T|\choose i}g_{T} \end{aligned} $$

其中 g_{T} 表示 T 中石子都在 c 之后的概率。

那么我们只需要考虑 $T\cup\{c\}$ 这个集合，甚至只需要关心 T 中有几个在 $[1,c-1]$ 有几个在 $[c+1,n]$ 即可。

设有 i 个在 $[1,c-1]$ j 个在 $[c+1,n]$ 那么这样的 T 有 ${c-1\choose i}{n-c\choose j}$ 个，合法的概率为（设 c 在第 t 轮删除）：

$$ \begin{aligned} &\sum_{t=0}^{+\infty}\left((1-p)^{t+1}\right)^{i}\left((1-p)^{t}\right)^{j+1}p\\ =&\frac{p(1-p)^{i}}{1-(1-p)^{i+j+1}} \end{aligned} $$

显然可以卷积求出 g 然后再卷积求出 f 即可。

From:
https://wiki.cvbbacm.com/ - **CVBB ACM Team**

Permanent link:
https://wiki.cvbbacm.com/doku.php?id=2020-2021:teams:intrepidsword:2020-hdu-multi-3

Last update: **2021/08/27 17:46**