

152. Writing 1/2 as a sum of inverse squares

题目大意：问有多少种方式将 $\frac{1}{2}$ 表示成 $2 \sim 80$ 之间的不同数的倒数平方和。

题解：感觉除了暴力没啥好的性质。首先将所有倒数平方乘上 $\text{lcm}(2^2, \dots, 80^2)$ 就转成了一个 meet-in-middle 问题。但是将近 80^2 个数太多了。不知道为什么就发现了有很多数是不可能选取的。具体来说，选取 lcm 的一个小约数，你会发现大部分的元素模它为 0 ，对于模它不为 0 的所有元素，直接 2^n 枚举一下组合，然后就会发现有些数永远不能出现在组合中，否则就没法凑出 0 。随便选一些（其实是有一些规律的）约数筛选后，就只剩下 30 多个可选的元素了。

195. Inscribed circles of triangles with one angle of 60 degrees

题目大意：大约是要求 $a^2 - ab + b^2 = c^2$ 的正整数解。

题解：部分这样的三元二次齐次不定方程有很漂亮的解法。

$$\begin{aligned} & |a-b|\omega|^2 = |a-\frac{b}{\sqrt{3}}-\frac{b\sqrt{3}}{2}|^2 = a^2 - ab + b^2 \end{aligned}$$

其中 $\omega = \frac{1+\sqrt{3}}{2}$ 为 $\omega^3 + 1 = 0$ 的解。

$$\begin{aligned} & (a^2 - ab + b^2)^2 = |a-b|\omega|^4 \\ & = |a^2 - 2ab + b^2 + b^2\omega^2|^2 = |a^2 - b^2 - (2ab - b^2)\omega|^2 \\ & = (a^2 - b^2)^2 - (a^2 - b^2)(2ab - b^2) + (2ab - b^2)^2 \end{aligned}$$

枚举 a, b 即可得到通解（不会证充分性）。

251. Cardano Triplets

题目大意：求满足 $a+b+c \leq n \sqrt[3]{a+b\sqrt{c}} + \sqrt[3]{a-b\sqrt{c}} = 1$ 的正整数 (a, b, c) 数量。

题解：不妨设 $a+b\sqrt{c} = (\frac{1}{2} + t\sqrt{c})^3$ 则 $a-b\sqrt{c} = (\frac{1}{2} - t\sqrt{c})^3$ 因此有：

$$\begin{aligned} & \frac{1}{8} + \frac{3}{4}t\sqrt{c} + \frac{3}{2}t^2c + t^3c\sqrt{c} = a+b\sqrt{c} \\ & \frac{1}{8} - \frac{3}{4}t\sqrt{c} + \frac{3}{2}t^2c - t^3c\sqrt{c} = a-b\sqrt{c} \end{aligned}$$

两式相加、相减得

$$\frac{1}{4} + \frac{3}{2}t^2c = a \tag{1}$$

$$\frac{3}{2}t\sqrt{c} = b \tag{2}$$

由式 1 可得 t^2 是有理数，由式 2 可得 t 是有理数。不妨设 c 无平方因子，那么显然 t 应该有 $\frac{2k+1}{2}(k \in \mathbb{Z})$ 的形式。枚举 c, t 即可。

253. Tidying up

题目大意：有一个 $1 \times n$ 的格子，随机一个 $1 \sim n$ 的排列给它染色，求染色过程中连续子段最大值的期望。

题解：状压 dp 当然是要 TLE 的啦。

注意到连续的一段 1 可以压缩，除了开头和末尾之外 的连续的 0，它们的顺序可以随意交换。

这样复杂度就是 n 的拆分数乘上很多个 n 了。

278. Linear Combinations of Semiprimes

$2pqr - pq - pr - qr$

291. Panaitopol Primes

题目大意：设 $x, y \in \mathbb{N}^+$ 且 $p = \frac{x^4 - y^4}{x^3 + y^3}$ 求所有 $\leq n$ 且为质数的 p 的和。

题解

$$\begin{aligned} p &= \frac{(x^2 + y^2)(x-y)}{(x^2 - xy + y^2)(x+y)} \\ &= (x^2 + y^2)(x-y) \end{aligned}$$

因为 p 是质数，所以 $p \mid (x-y)$ 或 $p \mid (x^2 + y^2)$ 。若 $p \mid (x-y)$ 那么 $(x^2 + y^2) \mid (x^2 - xy + y^2)$ 矛盾。因此 $p \mid (x^2 + y^2) \mid (x-y) \mid (x^2 - xy + y^2)$ 易得 $(x-y) \mid (x^2 - xy + y^2) \mid (x-y) \mid (xy) \mid (y^2)$ 。设 $x^2 = a(x-y)$ ， $xy = b(x-y)$ ， $y^2 = c(x-y)$ 。由于 $(x-y)^2 = a(x-y) - 2b(x-y) + c(x-y)$ ，因此 $(x-y) = a + c - 2b$ 。又由于 $x^2 y^2 = ac(x-y)^2 = b^2(x-y)^2$ ，因此 $ac = b^2$ 。故

$$\begin{aligned} p &= \frac{(a+c)(x-y)^2}{(a+c-b)(x-y)} \\ &= \frac{(a+c)(a+c-2b)}{a+c-b} \end{aligned}$$

设 $g = \gcd(a, b, c)$ 有

$$p = g \frac{(a'+c')(a'+c'-2b')}{a'+c'-b'} \quad (a' = a/g, b' = b/g, c' = c/g)$$

不妨设质数 $q \mid \gcd(a'+c'-2b', a'+c'-b')$ ，那么 $q \mid b'$ 。又因为 $a'c' = b'^2$ ，因此 $q \mid a'$ 或 $q \mid c'$ 。从而 $q \mid a', b', c'$ 矛盾。同理 $\gcd(a'+c', a'+c'-b') = 1$ ，因此 $(a'+c'-b') \mid g$ 。要使 p 为质数，必然有 $a'+c'-2b' = 1$ 以及 $g = a'+c'-b'$ 联立 $a'c' = b'^2$ 可得 $\sqrt{a'} - \sqrt{c'} = 1$ 。因此 $p = a'+c'$ 有 $p = n^2 + (n+1)^2 (n \in \mathbb{N}^+)$ 的形式。

319. Bounded Sequences

题目大意：定义整序列 $\{x_n\}$ 满足要求当且仅当：

- $x_1 = 2$
- $\forall 1 < i \leq n \quad x_{i-1} < x_i$
- $\forall 1 \leq i, j \leq n \quad x_i^j < (x_j + 1)^i$

定义 $f(n)$ 表示长度为 n 的满足要求的序列的数量，求 $f(10^{10})$

题解

$$\begin{aligned} & x_i^j < (x_j + 1)^i \\ & \ln x_i^j < \ln(x_j + 1)^i \\ & j \ln x_i < i \ln(x_j + 1) \end{aligned}$$

那么序列合法，当且仅当 $\exists t$ 使得 $\forall i \frac{\ln x_i}{i} \leq t < \frac{\ln(x_j + 1)}{j}$ 即 $e^{it-1} < x_i \leq e^{it}$ 那么 $x_i = \lfloor e^{it} \rfloor$ 令 $i=1$ 可得 $\ln 2 \leq t < \ln 3$

注意到 e^{it} 关于 t 连续且单调递增，考虑 t 从 $\ln 2$ 增加到 $\ln 3$ 的过程，显然只有 $\exists i$ 使得 e^{it} 为整数的 t 才会产生一个新的序列。

设 $t = \frac{\ln z}{d}$ $z = \prod_{j=1}^e p_j^{s_j}$ 且 $\gcd(s_1, \dots, s_e, d) = 1$ 那么 e^{it} 为整数，当且仅当 $d | i$ $e^{it} = \prod_{j=1}^e p_j^{s_j} \cdot \frac{1}{d}$ 若 $i \nmid d$ 就有 $\frac{1}{d} \nmid s_j$ 矛盾。

不妨设 $g(m)$ 为 $0 \leq t < m$ 的 t 的数量，则答案为 $g(\ln 3) - g(\ln 2)$ 考虑枚举 d

$$\begin{aligned} g(m) &= \sum_{d=1}^m \sum_{u \mid d} \mu(u) (e^m)^{\frac{d}{u}} \\ &= \sum_{u=1}^m e^{\mu(u)} \sum_{u=1}^m \lfloor \frac{m}{u} \rfloor \end{aligned}$$

然后杜教筛就可以 $\mathcal{O}(n^{\frac{2}{3}})$ 解决啦。

423. Consecutive die throws

题目大意：连续投掷一枚均匀骰子 n 次，定义价值为相邻投掷结果相同的数量，定义 $C(n)$ 为价值不超过 $\pi(n)$ 小于等于 n 的质数数量的投掷结果数 $S(n) = \sum_{i=1}^n C(i)$ 求 $S(5 \times 10^7)$

题解：首先求某一价值 k 的方案数 $f(n, k)$

$$\begin{aligned} f(n, k) &= \sum_{|T|=k} (-1)^{|T|-k} \binom{|T|}{k} \binom{n-1}{|T|-1} \sum_{|T|=k} \sum_{|T|=k} (-1)^{|T|-k} \frac{|T|!}{k!(|T|-k)!} \frac{(n-1)!}{(|T|-1)!} \binom{n-1}{|T|-1} \sum_{|T|=k} \sum_{|T|=k} (-1)^{|T|-k} \frac{(|T|-k)!(n-1-|T|)!}{(|T|-1-|T|)!} \binom{n-1-|T|}{|T|-1} \sum_{|T|=k} \sum_{|T|=k} (-1)^{|T|-k} \binom{n-1-k}{|T|-k} \binom{n-1-k}{n-1-|T|} \sum_{t=0}^{n-1-k} (-1)^t \binom{n-1-k}{t} \binom{n-1-k}{n-t-k} \end{aligned}$$

那么显然有

$\$ C(n)=|\Sigma| \sum_{k=0}^{\lfloor \pi(n) \rfloor} \binom{n-1}{k} (|\Sigma|-1)^{n-1-k}$

对于这样的组合数前缀和，使用递推即可轻松解决。定义 $F(n,m)=\sum_{k=0}^m \binom{n}{k} (|\Sigma|-1)^{n-k}$ 则有

$\$ \begin{aligned} F(n,m) &= \sum_{k=0}^m \binom{n}{k} (|\Sigma|-1)^{n-k} \\ &= \sum_{k=0}^m \binom{n-1}{k-1} (|\Sigma|-1)^{n-k} + \sum_{k=0}^{m-1} \binom{n-1}{k} (|\Sigma|-1)^{n-1-k} + (|\Sigma|-1) \sum_{k=0}^{m-1} \binom{n-1}{k} (|\Sigma|-1)^{n-1-k} \\ &\quad &= |\Sigma| F(n-1, m-1) - \binom{n-1}{m} (|\Sigma|-1)^{n-1-m} \end{aligned}$

443. GCD sequence

题目大意：设 $f(4)=13, f(n)=f(n-1)+\gcd(n, f(n-1)) (n \geq 5)$ 求 $f(10^{15})$

题解：可以猜测会有大段连续的 \$1\$。如果 $\gcd(n, f(n-1))=1$ 那么下一个合法的位置应该和 $f(n-1)-n$ 不互质，随便算算就好。实际只需要迭代几百次（很可能中间有一个大质数）。

479. Roots on the Rise

题目大意：设 a_k, b_k, c_k 是方程 $\frac{1}{x} = (\frac{k}{x})(k+x^2)-kx$ 的三根，求 $\sum_{k=1}^{10^6} \sum_{p=1}^{10^6} (a_k+b_k)^p (b_k+c_k)^p (c_k+a_k)^p$

题解：方程化简为 $x^3 - kx^2 + \frac{1}{x}kx - k^2 = 0$ 注意到 $(a_k+b_k)(b_k+c_k)(c_k+a_k) = (a_k+b_k+c_k)(a_kb_k+b_kc_k+c_ka_k) - a_kb_kc_k = 1 - k^2$ 等比数列求和一下就好了。似乎很多情况下轮换对称式都能用根与系数的关系来表示呢。

就好了。似乎很多情况下轮换对称式都能用根与系数的关系来表示呢。

488. Unbalanced Nim

题目大意：给你三堆石子，每堆石子的数量互不相同，两人轮流取走石子，每次可以选择一堆，从中取走一个以上的石子，要求取完之后仍要满足每堆石子的数量互不相同，最后不能操作者输。设三堆石子的数量分别为 a, b, c 设 $F(n)$ 表示满足 $0 < a < b < c < n$ 的所有负态的 $(a+b+c)$ 之和，求 $F(10^{18}) \bmod 10^9$

题解：先来研究负态满足的条件：

手动打表可以发现，负态为所有满足 $i \geq 0, 0 \leq j < 2^i, k \geq 1, 0 \leq u < 2^i$ 的 $(2^i+j-1, 2^{i+1}k+u-1, 2^{i+1}k+2^i+(j \oplus u)-1)$ 为了方便证明，不妨将三个数都加上 1 ，并稍微改写一下式子，得到：负态为所有满足 $i \geq 0, 0 \leq j < 2^i, k \geq 1, 0 \leq u < 2^i$ 的 $(2^i+(j \oplus u), 2^{i+1}k+j, 2^{i+1}k+2^i+u)$ 这等价于下面的叙述：设 $a, b, c (a < b < c)$ 的无前导 0 二进制表示分别为 $a=a'_n \dots a'_0, b=b'_n \dots b'_0, c=c'_n \dots c'_0$ b 和 c 最高的不相同的位为第 i 位，则 (a, b, c) 为负态的充

要条件为 $n_b = n_c$ 且 $a = b \oplus c$ 下面我们用归纳法来证明这一结论：

显然 $(1,2,3)$ 为负态，且满足上面的要求。

先证明不满足上面形式的状态是胜态：

- 若 $n_b < n_c$

- 若 $n_a = n_b$ 则 $(a \oplus b, a, b)$ 是一个负态。

- 若 $n_a < n_b$

- 若 $b'_a = 1$ 则 $(a, a \oplus b, b)$ 是一个负态。

- 若 $b'_a = 0$ 则 $(a, b, a \oplus b)$ 是一个负态。

- 若 $n_b = n_c$

- 若 $a > b \oplus c$ 则 $(b \oplus c, b, c)$ 是一个负态。

- 若 $a < b \oplus c$

- 若 $n_a < i$

- 若 $b'_a = 1$ 则 $(a, a \oplus b, b)$ 是一个负态。

- 若 $b'_a = 0$ 则 $(a, b, a \oplus b)$ 是一个负态。

- 若 $n_a = i$ 我们来证明 $a \oplus c < b$ 和 $a \oplus b < c$ 至少有一个成立：

设 a 和 $b \oplus c$ 最高的不相同的位为第 j 位，则有 $(a'_n \oplus c'_n) \dots (a'_{j+1} \oplus c'_{j+1}) = b'_n \dots b'_{j+1}$ 和 $(a'_n \oplus b'_n) \oplus (b'_n \oplus c'_n) = b'_{j+1} \oplus c'_{j+1}$ 均成立。又因为 $a < b \oplus c$ 所以有 $a'_j = 0, b'_j \oplus c'_j = 1$ 故 $a'_j \oplus c'_j < b'_j$ 和 $a'_j \oplus b'_j < c'_j$ 至少有一个成立，即

$a \oplus c < b$ 和 $a \oplus b < c$ 至少有一个成立 \Box

- 若 $a \oplus c < b$ 则 $(a, a \oplus c, c)$ 是一个负态。
- 若 $a \oplus b < c$ 则 $(a, b, a \oplus b)$ 是一个负态。

再证明满足上面形式的状态是负态：

- 若从 a 中取石子，由于 a 是由 b, c 唯一确定的，故取走 a 后肯定是胜态。
- 若从 b 中取石子
 - 若取完后 b 的位数小于 c 的位数，显然最大的两个数的位数不可能相等，也是一个胜态。
 - 若取完后 b 的位数等于 c 的位数，根据异或运算的性质 b 和 c 的异或值肯定发生了变化 a 也肯定不满足负态的要求。
- 若从 c 中取石子，与 b 类似可证 \Box

最后的答案可以通过一个简单的数位 dp 得到，这里就不再赘述了。

515. Dissonant Numbers

题目大意：对一个质数 p 定义 $S(i, p, 0) = i^{-1} \bmod p$ 定义 $S(n, p, k) = \sum_{i=1}^n S(i, p, k-1)$ 求 $S(p-1, p, a)$

题解：可得

$$\begin{aligned} S(p-1, p, a) &= \sum_{i=1}^{p-1} \frac{(a+p-2-i)!}{(a-1)!} \\ &= - \sum_{i=1}^{p-1} \frac{(a+p-2-i)!}{(a-1)!} \cdot \frac{1}{(p-i)!} \\ &= - \sum_{i=1}^{p-1} \frac{(a-2+i)!}{(a-1)!(i-1)!} \cdot \frac{1}{(p-i)!} \\ &= - \sum_{i=1}^{p-1} \frac{(a-2+i)!}{(a-1)!(i-1)!} \\ &= - \frac{1}{(a-1)} \sum_{i=1}^{p-1} \frac{(a-2+i)!}{(a-2)!(i-1)!} \\ &= - \frac{1}{(a-1)} \sum_{i=1}^{p-1} \binom{a-2+i}{i} \\ &= - \frac{1}{(a-1)} \left(\binom{a-2}{0} + \binom{a-2}{1} + \dots + \binom{a-2}{p-1} \right) \\ &= - \frac{1}{(a-1)} (2^{a-2} - 1) \end{aligned}$$

545. Faulhaber's Formulas

[Von Staudt–Clausen theorem](#)

581. 47-smooth triangular numbers

[Størmer's theorem](#)

613. Pythagorean Ant

题目大意：有一个边长 \$3,4,5\$ 的三角形，一只蚂蚁等概率随机地在三角形中一点，然后等概率选择一个方向沿射线走。问穿过斜边的概率。

题解：其实就是一个二重积分，但是第二重好像很恶心的样子，所以就只积了一重，第二重数值积分：

$$\begin{aligned} & \int_0^{\pi} \int_{-\frac{3-y}{\sqrt{3-y^2}}}^{\frac{3-y}{\sqrt{3-y^2}}} \frac{1}{\sqrt{1 + \left(\frac{y}{x}\right)^2}} dx dy = \pi \int_0^{\pi} \left[\frac{1}{2} \ln \left(1 + \left(\frac{y}{x}\right)^2 \right) \right]_{-\frac{3-y}{\sqrt{3-y^2}}}^{\frac{3-y}{\sqrt{3-y^2}}} dy \\ &= \pi \int_0^{\pi} \left[\frac{1}{2} \ln \left(1 + \left(\frac{3-y}{\sqrt{3-y^2}}\right)^2 \right) - \frac{1}{2} \ln \left(1 + \left(\frac{-3+y}{\sqrt{3-y^2}}\right)^2 \right) \right] dy \end{aligned}$$

我爱 python
我爱 scipy

622. Riffle Shuffles

题目大意：设排列 $p=(0,n,1,n+1,2,n+2,\dots,n-1,2n-1)$ 求出所有使得最小循环节为 60 的 $2n$ 之和。

题解：显然 p 与 p^{-1} 的循环节长度相同 $\Rightarrow p^{-1}=(0,2,4,\dots,2n-2,1,3,5,\dots,2n-1)$ 注意到除了 $2n-1$ 之外，满足 $p^{-1}(x)=2x \bmod (2n-1)$ 但是 $2n-1$ 本身即成一个环，可以不用考虑。算一算可以发现，最小循环节长度即为最小的使得 $x \equiv 1 \pmod{2n-1}$ 的 x 要使最小循环节为 60 ，那么要有

$2n-1 \mid 2^{60}-1 \Rightarrow 2n-1 \mid 2^{30}-1 \mid 2^{20}-1 \mid 2^{12}-1$ 稍微算一下即可。

624. Two heads are better than one

题目大意：随机抛一枚硬币，当出现两次正面时停止。设 $P(n)$ 表示停止时抛硬币的次数能被 n 整除的概率，求 $P(10^{18}) \bmod (10^{18}+9)$

题解：设 $f_{\{H\}}(x), f_{\{T\}}(x)$ 表示当前未结束，且结尾为 H 或 T 的概率 $\Rightarrow f_{\{HH\}}(x)$ 表示当前已经结束的概率。那么可以写出生成函数方程：

$$\begin{aligned} & f_{\{HH\}}(x) = \frac{1}{2}x f_{\{H\}}(x) + x f_{\{HH\}}(x) \\ & f_{\{H\}}(x) = \frac{1}{2}x f_{\{T\}}(x) + \frac{1}{2} f_{\{H\}}(x) \\ & f_{\{T\}}(x) = \frac{1}{2}x(f_{\{H\}}(x) + f_{\{T\}}(x)) + \frac{1}{2} \end{aligned}$$

代入 \Rightarrow 可得 $f_{\{T\}}(x) = \frac{1}{2}x + \frac{1}{2}x^4 + \frac{1}{2}x^6 + \dots$ 代回 \Rightarrow 可得 $f_{\{H\}}(x) = \frac{1}{2}x + \frac{1}{2}x^4 + \frac{1}{2}x^6 + \dots$ 代回 \Rightarrow 可得 $f_{\{HH\}}(x) = \frac{1}{2}x + \frac{1}{2}x^4 + \frac{1}{2}x^6 + \dots$ 所求即为 $f_{\{HH\}}(x) = \frac{1}{2}x + \frac{1}{2}x^4 + \frac{1}{2}x^6 + \dots$

因此有 $g_0=0, g_1=\frac{1}{2}, g_n=\frac{1}{2}g_{n-1}+\frac{1}{2}g_{n-2}$ 可以解得特征方程的两个根为 $654248003, 845752011$ 。从而解得通项为 $361699202 \times 654248003^n + 638300807 \times 845752011^n$ 最后等比数列求和一下就好了。

692. Siegbert and Jo

题目大意：一个游戏有 n 颗石子，两人轮流拿，每人最少拿一颗，最多拿上一个人拿的两倍。第一次拿没有限制。设 $f(n)$ 表示先手最少拿几颗保证必胜，求 $\sum_{k=1}^n f(k)$

题解：这题出过很多次了，主要是 $f(n)$ 的定义给了我另一个视角看待这个问题。 $f(n)$ 本身其实是可以直接计算的，不需要分析胜负态。 $f(n)$ 即为最小的 i 使得 $2i < f(n-i)$ 。答案打表找规律即可。

711. Binary Blackboard

题目大意：给出一个正整数 n 并在黑板上写下 n 的二进制表示，之后先手后手轮流在黑板上写正整数的二进制表示，并保证和不超过 $2n$ 不能写时游戏结束。如果 1 的数量为奇数，先手胜，否则后手胜。分析胜负态。

题解：定义 $f(n) = \text{bitcnt}(n)$ 。若 \exists

$x+y=n$ 且 $y=2^{f(n)}-1, f(n)+f(x)+f(y) \equiv 1 \pmod{2}$ 。那么显然先手必胜，先手写上 x 后，不论后手写什么，先手写上 y 减它即可获胜。

考虑 n 最后连续的 1 的数量 d 分类讨论（以下都是所有位不全为 1 的情况）：

- 若 d 为奇数，且前面存在一个偶数位 b 为 1 ，那么令 $x=n-2^d+1$ ， $f(n)+f(x)+f(y)=2f(n)-d+1+b$ 为一个奇数，因此先手胜。
- 若 d 为偶数，且前面存在一个奇数位 b 为 1 ，同理先手胜。

若全部位都为 1 ，后手只需把所有数拿走就可以获胜了。

剩余两种情况，不会证了。。。

- 若 d 为奇数，且前面所有为 1 的位均为奇数，先手胜。
- 若 d 为偶数，且前面所有为 1 的位均为偶数，先手负。

741. Binary grid colouring

题目大意：在一个 $n \times n$ 的网格上黑白染色，使得每行每列均恰好有两个格子是黑的，求在旋转和对称等价的意义下不同的方案数。

题目大意：显然需要使用 burnside 引理，总共需要计算 5 种情况，分别是无限制、旋转 90° 相同、旋转 180° 相同、沿对角线对称、水平或竖直对称。

解决这道题的关键思想是将其看做一个图的邻接矩阵（但是行顺序有关系），由于每一列有 2 个黑格子，相当于每个点的度数都是 2 ，也就是说图是由若干个环组成的。确定好边集后，行之间还可以任意排列，但是需要注意二元环的两条边交换没有意义，故每个二元环需要除 2 。总而言之，通过枚举 1 所在的环，可以列出 dp 方程：

$$\begin{aligned} dp_i &= \sum_{j=2}^i \frac{A_{i-1}^{j-1}}{2} \cdot dp_{i-j} \\ &= (i-1)! \sum_{j=2}^i \frac{dp_{i-j}}{(i-j)!} \end{aligned}$$

答案是 $n! dp_n$ 可以 $\mathcal{O}(n)$ 计算。

旋转 90° 时，若 n 为奇数，由于黑格子的数量模 4 总不为 0，因此无论 n 为偶数的时候，考虑左上一半格子，它旋转 90° 后要每行每列各有 2 个黑格子，可以证明这等价于第 i 行加第 i 列的黑格子数为 2。考虑第 1 行第 1 列的放置方式，分类讨论一下可以 dp 解决。

旋转 180° 时，考虑将第 i 列和第 $n+1-i$ 列看作同一个点。当 n 为偶数时与第一种情况大体相同，区别在于可以有自环，并且第 i 列和第 $n+1-i$ 列是两种不同的方案。当 n 为奇数时较复杂。首先不妨将中间行和中间列的黑点都放在两侧。第一行有两种情况，填 $1/n$ 或填其它。填 $1/n$ 时，归约到了 $n-3$ 的情况。否则不妨设填了 2，那么相当于 1 和 2 的度只能是 1，那么可以枚举一下 1-2 的这一条链中间的点，然后也能归约到偶数的情况。

沿对角线对称时与旋转 90° 类似，而沿水平/垂直对称最为简单。

时间复杂度 $\mathcal{O}(n)$

From:
<https://wiki.cvbbacm.com/> - CVBB ACM Team

Permanent link:
https://wiki.cvbbacm.com/doku.php?id=2020-2021:teams:intrepidsword:zhongzihao:project_euler&rev=1612932605

Last update: 2021/02/10 12:50

