2025/11/05 22:05 1/3 莫比乌斯反演

# 莫比乌斯反演

# 简介

莫比乌斯反演是数论中的重要内容. 对于一些函数 \$f(n)\$, 如果很难直接求出它的值, 而容易求出其倍数和或约数和 \$q(n)\$, 那么可以通过莫比乌斯反演简化运算, 求得 \$f(n)\$ 的值

开始学习莫比乌斯反演前, 我们需要一些前置知识: 积性函数□Dirichlet 卷积、莫比乌斯函数.

### 前置知识

#### 引理1

\$\$ \forall a,b,c\in

### 引理2

\$\$ \forall n\in

 $N, \left| \left( \frac{n}{d} \right) \right| N, \left| \left( \frac{n}{d} \right)$ 

\$|V|\$ 表示集合 \$V\$ 的元素个数

### 数论分块

数论分块的过程大致如下: 考虑含有 \$\left\lfloor\frac{n}{i}\right\rfloor\$ 的求和式子(\$n\$ 为常数)

对于任意一个 \$i\$ (\$i\le n\$), 我们需要找到一个最大的 \$j\$ (\$i\le j\le n\$), 使得 \$\left\lfloor\frac{n}{i}\right\rfloor=\left\lfloor\frac{n}{j}\right\rfloor\$.

而 \$j=\left\lfloor\frac{n}{\left\lfloor\frac{n}{i}\right\rfloor}\right\rfloor\$.

利用上述结论, 我们每次以 \$[i,j]\$ 为一块, 分块求和即可

# 积性函数

#### 定义

若 \$gcd(x,y)=1\$ 且 \$f(xy)=f(x)f(y)\$, 则 \$f(n)\$ 为积性函数.

### 性质

若 \$f(x)\$ 和 \$g(x)\$ 均为积性函数,则以下函数也为积性函数: \$\$ h(x)=f(x^p)\\ h(x)=f^p(x)\\  $h(x)=f(x)g(x)\h(x)=\sum {d|x}f(d)g(\frac{x}{d})$ \$

### 例子

单位函数: \$\varepsilon(n)=[n=1]\$

恒等函数: \$id k(n)=n^k, id 1(n)\$ 通常简记为 \$id(n)\$

常数函数: \$1(n)=1\$

除数函数: \$\sigma k(n)=\sum {d|n}d^k\$, \$\sigma 0(n)\$ 通常简记作 \$d(n)\$ 或 \$\tau(n)\$,

\$\sigma\_1(n)\$ 通常简记作 \$\sigma(n)\$

欧拉函数: \$\varphi(n)=\sum\_{i=1}^n[gcd(i,n)=1]\$

莫比乌斯函数: \$\mu(n)=\left\{\begin{array}{}1\qquad\qquad\quad n=1\\0\qquad\qquad\quad\quad \exist d>1:d^2|n\\(-1)^{\omega(n)}\gquad otherwise\end{array}\right.\$ 其中 \$\omega(n)\$ 表示 \$n\$ 的本质 不同质因子个数,是一个积性函数

# Dirichlet 卷积

### 定义

定义两个数论函数 \$f,g\$ 的 \$Dirichlet\$ 卷积为 \$\$ (f\*g)(n)=\sum\_{d|n}f(d)g(\frac n d) \$\$

#### 性质

\$Dirichlet\$ 卷积满足交换律和结合律

其中 \$\varepsilon\$ 为 \$Dirichlet\$ 卷积的单位元 (任何函数卷 \$\varepsilon\$ 都为其本身)

### 例子

 $\$  \varepsilon=\mu\*1\Longleftrightarrow\varepsilon(n)=\sum\_{d|n}\mu(d)\\ d=1\*1\Longleftrightarrow  $d(n)=\sum_{d|n}\\\$  \sigma=id\*1\Longleftrightarrow\sigma(n)=\sum {d|n}d\\ \varphi=\mu\*id\Longleftrightarrow\varphi(n)=\sum {d|n}d\cdot\mu(\frac n d) \$\$

## 莫比乌斯函数

https://wiki.cvbbacm.com/ Printed on 2025/11/05 22:05

#### 定义

\$\mu\$ 为莫比乌斯函数, 定义为 \$\$ \mu(n)=\left\{ \begin{array}{I} 1&n=1\\ 0&n含有平方因子\\ (-1)^k&k为n的本质不同质因子个数 \end{array}\right. \$\$ 详细解释一下:

令 \$n=\prod\_{i=1}^kp\_i^{c\_i}\$, 其中 \$p\_i\$ 为质因子, \$c\_i\ge1\$. 上述定义表示:

- 1. \$n=1\$ 时, \$\mu(n)=1\$;
- 2. 对于 \$n\ne1\$ 时:
  - 1. 当存在 \$i\in[1,k]\$, 使得 \$c i>1\$ 时, \$\mu(n)=0\$, 也就是说只要某个质因子出现的次数超过 一次, \$\mu(n)\$ 就等于 \$0\$;
  - 2. 当任意 \$i\in[1,k]\$, 都有 \$c i=1\$ 时, \$\mu(n)=(-1)^k\$, 也就是说每个质因子都仅仅只出现过 一次时, 即 \$n=\prod\_{i=1}^kp\_i\$, \$\{p\_i\}\_{i=1}^k\$ 中各元素唯一时, \$\mu(n)\$ 等于 \$-1\$ 的 \$k\$ 次幂, 此处 \$k\$ 指的便是仅仅只出现过一次的质因子的总个数.

#### 性质

莫比乌斯函数不但是积性函数, 还有如下性质: \$\$ \sum\_{d|n}\mu(d)=\left\{ \begin{array}{I} 1&n=1\\ 0n\ne1 \end{array}\right. \$\$ 即 \$\sum {d|n}\mu(d)=\varepsilon(n)\$, 即 \$\mu\*1=\varepsilon\$ \$\$ [gcd(i,j)=1]\Longleftrightarrow\sum\_{d|gcd(i,j)}\mu(d) \$\$

\$\$ \varphi\*1=ID \$\$

(\$ID\$ 函数即 \$f(x)=x\$)

该式子两侧同时卷 \$\mu\$ 可得 \$\varphi(n)=\sum {d|n}d\cdot\mu(\frac{n}{d})\$

# 莫比乌斯反演

#### 公式

设 \$f(n),g(n)\$ 为两个数论函数

如果有 \$\$ f(n)=\sum {d|n}q(d) \$\$ 那么有 \$\$ g(n)=\sum {d|n}\mu(d)f(\frac{n}{d}) \$\$

From: https://wiki.cvbbacm.com/ - CVBB ACM Team

Last update: 2020/07/03 22:35

