

LGV 引理

算法简介

一种统计有向无环图不相交路径集的算法。

算法原理

定义路径的权值 $w(P)$ 表示路径 P 的所有边权之积。

定义 $e(u,v)$ 表示所有 $u \rightarrow v$ 的路径的权值之和，即 $e(u,v) = \sum_{P \in \{u \rightarrow v\}} w(P)$

定义起点集合为 A 其中第 i 个起点为 a_i 终点集合为 B 其中第 i 个终点为 b_i

定义路径组的集合 $S(A,B)$ 中的每个元素 c 表示一个路径组，含有 n 条路径，其中第 i 条路径 $a_i \rightarrow b_{p_i}$ P 是 $1 \sim n$ 的排列。

定义 $N(c)$ 表示路径组 c 的 P 排列中的逆序对个数 $w(c)$ 表示路径组 c 的所有路径权值之积。

设

$$M = \begin{bmatrix} e(a_1, b_1) & e(a_1, b_2) & \cdots & e(a_1, b_n) \\ e(a_2, b_1) & e(a_2, b_2) & \cdots & e(a_2, b_n) \\ \vdots & \vdots & \ddots & \vdots \\ e(a_n, b_1) & e(a_n, b_2) & \cdots & e(a_n, b_n) \end{bmatrix}$$

则有

$$\det M = \sum_{c \in S(a,b)} (-1)^{N(c)} w(c)$$

特别的，令图上所有边权为 1 ，同时限定 a_i 的对应点一定是 b_i 即 c 的排列就是 $1 \sim n$

此时有 $N(c) = 0, w(c) = 1$ 于是

$$\det M = \sum_{c \in S(a,b)} 1$$

算法模板

给定一个二维平面，求满足如下条件的 k 元路径组个数：

- 第 i 条路径 $(1, a_i) \rightarrow (n, b_i)$
- 每次移动只能选择 $(x, y) \rightarrow (x, y+1), (x+1, y)$

显然 $e(i,j) = \binom{n-1+b_j-a_i}{n-1}$ 然后直接跑高斯消元板子，时间复杂度 $O(k^3)$

```
const int mod=1e9+7,MAXN=2e5+5,MAXK=105;
int quick_pow(int n,int k){
```

```
int ans=1;
while(k){
    if(k&1)ans=1LL*ans*n%mod;
    n=1LL*n*n%mod;
    k>>=1;
}
return ans;
}
int frac[MAXN],invf[MAXN];
int C(int n,int m){
    if(n<m)return 0;
    return 1LL*frac[n]*invf[m]%mod*invf[n-m]%mod;
}
int a[MAXN],b[MAXN];
int c[MAXK][MAXK];
int cal(int n){
    int ans=1;
    _rep(i,1,n){
        int pos=0;
        _rep(j,i,n){
            if(c[j][i]){
                pos=j;
                break;
            }
        }
        if(!pos)return 0;
        if(pos!=i){
            _rep(j,i,n)
            swap(c[i][j],c[pos][j]);
        }
        ans=1LL*ans*c[i][i]%mod;
        int t=quick_pow(c[i][i],mod-2);
        _rep(j,i,n)
        c[i][j]=1LL*c[i][j]*t%mod;
        _rep(j,i+1,n){
            for(int k=n;k>=i;k--)
                c[j][k]=(c[j][k]-1LL*c[j][i]*c[i][k])%mod;
        }
    }
    return (ans+mod)%mod;
}
void solve(){
    int n=read_int(),k=read_int();
    _rep(i,1,k)a[i]=read_int();
    _rep(i,1,k)b[i]=read_int();
    _rep(i,1,k)_rep(j,1,k)
    c[i][j]=C(n-1+b[j]-a[i],n-1);
    enter(cal(k));
}
int main(){
```

```

frac[0]=1;
_for(i,1,MAXN)
frac[i]=1LL*frac[i-1]*i%mod;
invf[MAXN-1]=quick_pow(frac[MAXN-1],mod-2);
for(int i=MAXN-1;i;i--)
invf[i-1]=1LL*invf[i]*i%mod;
int T=read_int();
while(T--)
solve();
return 0;
}

```

算法例题

题意

给定一个二维平面，求满足如下条件的 n 元路径组个数：

1. 第 i 条路径 $(a_i, 0) \rightarrow (0, i)$
2. 每次移动只能选择 $(x, y) \rightarrow (x-1, y), (x, y+1)$

数据保证 $a_{i-1} < a_i$

题解

显然有

$$M = \begin{bmatrix} \binom{a_1+1}{1} & \binom{a_1+2}{2} & \cdots & \binom{a_1+n}{n} \\ \binom{a_2+1}{1} & \binom{a_2+2}{2} & \cdots & \binom{a_2+n}{n} \\ \vdots & \vdots & \ddots & \vdots \\ \binom{a_n+1}{1} & \binom{a_n+2}{2} & \cdots & \binom{a_n+n}{n} \end{bmatrix} = \prod_{i=1}^n \frac{1}{i!} \begin{bmatrix} \frac{(a_1+1)!}{a_1!} & \frac{(a_1+2)!}{a_1!} & \cdots & \frac{(a_1+n)!}{a_1!} \\ \frac{(a_2+1)!}{a_2!} & \frac{(a_2+2)!}{a_2!} & \cdots & \frac{(a_2+n)!}{a_2!} \\ \vdots & \vdots & \ddots & \vdots \\ \frac{(a_n+1)!}{a_n!} & \frac{(a_n+2)!}{a_n!} & \cdots & \frac{(a_n+n)!}{a_n!} \end{bmatrix}$$


设 $x_i = a_i + 1$ 则

$$M = \begin{bmatrix} x_1 & x_1(x_1+1) & \cdots & \prod_{i=0}^{n-1} (x_1+i) \\ x_2 & x_2(x_2+1) & \cdots & \prod_{i=0}^{n-1} (x_2+i) \\ \vdots & \vdots & \ddots & \vdots \\ x_n & x_n(x_n+1) & \cdots & \prod_{i=0}^{n-1} (x_n+i) \end{bmatrix}$$

从左到右用列消元，可以得到

$$M = \begin{bmatrix} x_1 & x_1^2 & \cdots & x_1^n \\ \vdots & \vdots & \ddots & \vdots \\ x_n & x_n^2 & \cdots & x_n^n \end{bmatrix}$$

From:
<https://wiki.cvbbacm.com/> - CVBB ACM Team

Permanent link:
https://wiki.cvbbacm.com/doku.php?id=2020-2021:teams:legal_string:jxm2001:lgv%E5%BC%95%E7%90%86&rev=1629009707 

Last update: **2021/08/15 14:41**