工科数学分析（2）

11 数项级数

11.1 数项级数的收敛性

11.2 正项级数的敛散性

正项级数比较判别法（很直观）

柯西积分判别法

$x\geqslant 1, f(x)\geqslant 0, f(x)$ 递减 $\Rightarrow \sum\limits_{n=1}^{\infty}f(x)$ 与 $\int_{1}^{+\infty}f(x)\mathrm{d}x$ 同散敛

正项级数柯西判别法（与几何级数比较）

- $(\exists \ 0<q<1, N \in \mathbb{N}^{\ast},s.t. \ n>N \Rightarrow \sqrt[n]{a_n}\le q < 1) \Rightarrow \sum\limits_{n=1}^{\infty} a_n$ 收敛
- $(\forall N \in \mathbb{N}^{\ast}, \exists n > N, s.t. \ \sqrt[n]{a_n}\ge 1) \Rightarrow \sum\limits_{n=1}^{\infty} a_n$ 发散
- $a_n\ge 0, (\lim\limits_{n\to \infty}\sqrt[n]{a_n}=q)\vee (\lim\limits_{n\to \infty}\sup\sqrt[n]{a_n}=q)$则
- $q < 1 \Rightarrow$ 敛
- $q > 1 \Rightarrow$ 散

正项级数达朗贝尔判别法

- $a_n > 0, b_n > 0, \exists n_0, (n\ge n_0\Rightarrow \frac{a_{n+1}}{a_n}\le \frac{b_{n+1}}{b_n})$则 $\sum b$ 敛 $\Rightarrow \sum a$ 敛，$\sum a$ 散 $\Rightarrow \sum b$ 散
- $a_n>0$
  1. $(\exists\ 0<q<1,n_0 \in \mathbb{N}^{\ast}, \mathrm{s.t.}\ n\ge n_0 \Rightarrow \frac{a_{n+1}}{a_n}\le q < 1) \Rightarrow \sum a$ 收敛
  2. $(\exists\ n_0 \in \mathbb{N}^{\ast}, \mathrm{s.t.}\ n\ge n_0 \Rightarrow

\frac{a_{n+1}}{a_n}\ge 1) \Rightarrow \sum a$ 发散

- $\lim\limits_{n\to \infty} \frac{a_{n+1}}{a_n} = q$
  1. $q<1 \Rightarrow \sum a$ 敛
  2. $q > 1 \Rightarrow \sum a$ 散
- $\lim\limits_{n\to \infty} \sup \frac{a_{n+1}}{a_n} = q < 1 \Rightarrow \sum a$ 敛
- $\lim\limits_{n\to \infty} \inf \frac{a_{n+1}}{a_n} = q > 1 \Rightarrow \sum a$ 散

正项级数拉贝判别法

1. $a_n>0$
   - $\exists\ r > 1, N_0\in \mathbb{N}^{\ast}$, 当 $n > N_0$ 时，有 $n(\frac{a_n}{a_{n+1}}-1)\ge r > 1$, 则 $\sum a$ 敛
   - $\exists\ N_0\in \mathbb{N}^{\ast}$, 当 $n > N_0$ 时，有 $n(\frac{a_n}{a_{n+1}}-1)\le 1$, 则 $\sum a$ 散
2. $a_n > 0, \frac{a_n}{a_{n+1}}=1+\frac{l}{n}+o(\frac{1}{n}) \quad (n\to \infty)$ 或 $\lim\limits_{n\to \infty} n(\frac{a_n}{a_{n+1}}-1) = l$则
   - $l>1 \Rightarrow \sum a$ 敛
   - $l<1 \Rightarrow \sum a$ 散

11.3 一般级数收敛问题

莱布尼茨判别法

交错级数 $\sum\limits_{n=1}^{\infty} (-1)^{n-1}a_n,\ a_n>0$若 $\{a_n\}$ 递减趋于 0，则级数收敛。

分部求和公式

$\displaystyle\{a_n\}, \{b_n\}$ 是实数列$\forall n\in \mathbb{N}^{\star}, S_k=\sum\limits_{i=1}^{k}a_i, S_0 = 0$则 $\sum\limits_{k=1}^{n}a_kb_k=\sum\limits_{k=1}^{n-1}S_k(b_k-b_{k+1})+S_nb_n$ \displaystyle我觉得这就跟分部积分一模一样嘛）

$\displaystyle\int S\mathrm{d}T = ST - \int T\mathrm{d}S$

把 a_n 看成 $\mathrm{d}S$$b_n$ 看成 $T$$\sum ab = \int T\mathrm{d}S=ST-\int S\mathrm{d}T = b\sum a + \sum (\sum a)(b_k - b_{k+1})$

阿贝尔引理

$\displaystyle\{b_n\}$ 单调$\left|\sum a\right|\le M$则 $|\sum\limits_{k=1}^{n}a_kb_k|\le M(|b_1|+2|b_n|)$.

狄利克雷判别法

$\displaystyle\{b_n\}$ 单调递减趋 0□$\sum a$ 有界 $\Rightarrow \sum\limits_{k=1}^{\infty} a_kb_k$ 收敛.

阿贝尔判别法

$\displaystyle\{b_n\}$ 单调有界□$\sum a$ 收敛 $\Rightarrow \sum\limits_{k=1}^{\infty} a_kb_k$ 收敛.

11.4 更序问题与级数乘法

更序问题

$\displaystyle\mathbf{Th.\; 11.4.1}$

若级数绝对收敛，则其正项和与负项和均收敛；
若其条件收敛，则两者均发散到无穷大。

$\displaystyle\mathbf{Th.\; 11.4.2}$

若级数绝对收敛，则任意调整其中各项顺序得到的新级数也绝对收敛，且和不变。

$\displaystyle\mathbf{Th.\; 11.4.3}\;\;\text{Riemann 更序定理}$

若级数条件收敛，则可以通过调整其中的项的顺序使其收敛到任一确定实数。

级数乘法

$\displaystyle\mathbf{Def.}\;\;\text{Cauchy 乘积}$

$\displaystyle\sum\limits_{n=1}^{\infty}c_n = \sum\limits_{n=1}^{\infty} (x_1y_n+x_2y_{n-1}+\cdots+x_ny_1)$

称为级数 $\sum x$ 和 $\sum y$ 的 Cauchy 乘积。

$\displaystyle\mathbf{Th.\; 11.4.3}\;\;\text{Cauchy 定理}$

两级数收敛，则其柯西积亦收敛，且收敛于两级数收敛值之积。

12 函数项级数

12.1 收敛性

逐点收敛

$\displaystyle\forall x_0 \in I$若 $\{f_n(x_0)\}$ 收敛到 $f(x_0)$则称 $\{f_n(x)\}$ 在 I 上逐点收敛.

一致收敛

$\displaystyle\forall\ \varepsilon > 0, \exists N(\varepsilon) > 0$当 $n>N(\varepsilon)$ 时，$\forall x\in I$有 $|f_n(x)-f(x)|<\varepsilon$ 成立，则称函数序列 $\{f_n(x)\}$ 在 I 上一致收敛于 $f(x)$记为 $f_n(x)\stackrel{uni}{\longrightarrow} f(x)$.

12.2 一致收敛的判别

余项定理

$\displaystyle\lim\limits_{n\to \infty} \sup\limits_{x\in I} |f_n(x)-f(x)| = 0 \iff f_n(x)\stackrel{uni}{\longrightarrow} f(x)\quad (n \in \mathbb{N}^{\star})$

柯西收敛定理

$\displaystyle\forall x_0 \in I, \forall \varepsilon > 0, \exists N(x_0, \varepsilon) \in \mathbb{N}^{\star}, \forall n > N, \forall p \in \mathbb{N}^{\star}: |f_n(x_0) - f_{n+p}(x_0)| < \varepsilon \iff \{f_n(x)\}$ 在 I 上逐点收敛.

$\displaystyle\forall \varepsilon > 0, \exists N(\varepsilon) \in \mathbb{N}^{\star}, \forall n > N, \forall p \in \mathbb{N}^{\star},\forall x \in I: |f_n(x) - f_{n+p}(x)| < \varepsilon \iff \{f_n(x)\}$ 在 I 上一致收敛.

维尔斯特拉斯（Weierstrass）判别法（M 判别法，控制判别法）

若存在收敛的正项级数 $\sum a_n$使得 $\forall x \in I$都有 $|u_n(x)|\le a_n$则 $\sum u_n(x)$ 在 I 上一致收敛.

狄利克雷判别法

$$\sum\limits_{n=1}^{\infty}a_n(x)b_n(x)$$

若在 I 上：

$\displaystyle\{b_n(x)\}$ 对固定的 x 单调，一致收敛至 0.

$\displaystyle\sum\limits_{n=1}^{N}a_n(x)$ 在 I 上一致有界.

则 $\sum\limits_{n=1}^{\infty}a_n(x)b_n(x)$ 在 I 上一致收敛.

阿贝尔判别法

$$\sum\limits_{n=1}^{\infty}a_n(x)b_n(x)$$

若在 I 上：

$\displaystyle\{b_n(x)\}$ 对固定的 x 单调，在 I 上一致有界.

$\displaystyle\sum\limits_{n=1}^{\infty}a_n(x)$ 在 I 上一致收敛.

则 $\sum\limits_{n=1}^{\infty}a_n(x)b_n(x)$ 在 I 上一致收敛.

12.3 极限函数/和函数性质

连续性

$f_n(x)$ 在 I 上连续$f_n(x)\stackrel{uni}{\longrightarrow}f(x)$则 $f(x)$ 在 I 上连续.

$\displaystyle\sum\limits_{n=1}^{\infty}u_n(x)$ 在 I 上一致收敛于 $S(x)$则 $u_n(x)\in C_{I} \Rightarrow S_n(x)\in C_{I}$

Dini 定理

$\displaystyle\{f_n(x)\}\in C[a,b]$若对任意给定 $x \in [a, b]$$\lim\limits_{n\to \infty}f_n(x)=0$$f_n(x)$ 递减，则 $\{f_n(x)\}$ 一致收敛于 0。

$\displaystyle\{f_n(x)\}\in C[a,b]$且收敛于 $f(x)$若对任意给定 $x \in [a, b]$$f_n(x)$ 单调，则 $\{f_n(x)\}$ 在 $[a, b]$ 上一致收敛于 $f(x)$

$\displaystyle\sum\limits_{n=1}^{\infty}u_n(x), u_n(x)\in C[a,b], u_n(x)\ge 0.$ 若 $S(x) \in C[a,b]$则 $\sum\limits_{n=1}^{\infty}u_n(x)$ 在 $[a, b]$ 上一致收敛。

积分

$\displaystyle\{f_n\}\in R[a,b]$$f_n(x)\stackrel{uni}{\longrightarrow} f(x)$则 $f \in R[a, b]$ 且 $\lim\limits_{n\to \infty}\int_{a}^{b}f_n(x)\mathrm{d}x=\int_{a}^{b}f(x)\mathrm{d}x$

（极限和积分交换顺序）

$\displaystyle\sum\limits_{n=1}^{\infty}u_n(x)\stackrel{uni}{\longrightarrow}S(x), u_n(x)\in R[a,b]$则 $S(x)\in R[a,b], \int_{a}^{b}(\sum\limits_{n=1}^{\infty}u_n(x))\mathrm{d}x = \sum\limits_{n=1}^{\infty}\int_{a}^{b}u_n(x)\mathrm{d}x$

求导

$f_n^{'}\in C[a,b], f_n^{'}\stackrel{uni}{\longrightarrow}g(x), \exists x_0\in[a, b], \{f_n(x_0)\}$ 收敛 $\Rightarrow \{f_n(x)\}$ 在 $[a,b]$ 上一致收敛于 $f(x)$且对 $\forall x \in [a,b], f^{'}(x)=g(x)$即 $[\lim f_n]^{'} = \lim [f_n^{'}]$

$u_n^{'}\in C[a,b], \sum\limits_{n=1}^{\infty}u_n^{'}(x)\stackrel{uni}{\longrightarrow}g(x), \exists x_0\in[a, b], \sum\limits_{n=1}^{\infty}u_n(x)$ 收敛 $\Rightarrow \sum\limits_{n=1}^{\infty}u_n(x)$ 在 $[a,b]$ 上一致收敛于 $f(x)$且 $S^{'}(x)\in C[a,b], S^{'}(x)=g(x)$即 $\left(\sum\limits_{n=1}^{\infty}u_n(x)\right)^{'} = \sum\limits_{n=1}^{\infty}u^{'}_n(x)$

12.4 幂级数

$\displaystyle\sum\limits_{n=0}^{\infty}a_n(x-x_0)^n$

$\displaystyle\sum\limits_{n=0}^{\infty}a_nx^n$

收敛性

Abel 定理

$\displaystyle\sum\limits_{n=0}^{\infty}a_nx^n$

若在 $x_0 \neq 0$ 处收敛，则对所有 $|x|<|x_0|$ 绝对收敛。

若在 $x_1 \neq 0$ 处发散，则对所有 $|x|>|x_1|$ 发散。

收敛半径

$R\in [0, +\infty)$

收敛半径公式

$R = \frac{1}{\lim\limits_{n\to \infty}\sqrt[n]{|a_n|}} = \lim\limits_{n\to \infty}|\frac{a_n}{a_{n+1}}|$

代数性质

$\displaystyle\sum a_nx^n: R_a,\; \sum b_nx^n: R_b,\; R=\min\{R_a, R_b\}.$ 则：

$\displaystyle\sum(a_n\pm b_n)x^n = \sum a_nx^n\pm \sum b_nx^n$ 在 $(-R, R)$ 上成立。

$\displaystyle\sum a_nx^n, \sum b_nx^n$ 的柯西积在 $(-R, R)$ 上绝对收敛。

内闭一致收敛性

$\displaystyle\forall [L, K] \subset (-R, R)$$\sum a_nx^n$ 在 $[L, K]$ 上一致收敛。

分析性质

Abel 第二定理

$\displaystyle\lim\limits_{x\to R^{-}} \sum\limits_{n=0}^{\infty} a_nx^n = \sum\limits_{n=0}^{\infty} a_nR^n$ （收敛时）

$\displaystyle\lim\limits_{x\to (-R)^{+}} \sum\limits_{n=0}^{\infty} a_nx^n = \sum\limits_{n=0}^{\infty} a_n(-R)^n$ （收敛时）

导数性质

$S(x)=\sum a_nx^n: R, \quad S(x)\in C(-R, R)$，$S(x)$ 在 $(-R, R)$ 上有任意阶导数，则

$S^{(k)}(x)=\sum\limits_{n=k}^{\infty} n(n-1)\cdots(n-k+1)a_nx^{n-k}=\sum\limits_{n=k}^{\infty} n^{\underline{k}}a_nx^{n-k}$

收敛域可能改变（端点处）

积分性质（???）

$S(x)\in R(-r,r)$，且可逐项积分，即对 $\forall x \in (-R,R)$ 有

$\displaystyle\int_{0}^{x}S(t)\mathrm{d}t=\sum\limits_{n=0}^{\infty}\int_{0}^{x}a_nt^n\mathrm{d}t=\sum\limits_{n=0}^{\infty}\frac{a_n}{n+1}x^{n+1}$

端点性质可能改变

展开

$f(x)=\sum\limits_{n=0}^{\infty}\frac{f^{(n)}(x_0)}{n!}(x-x_0)^n, \quad x\in (x_0-R,x_0+R)$

f 的泰勒级数收敛于 $f \iff \lim\limits_{n\to \infty}R_n(x)=0, \forall x\in U(x_0, R)$

f 的泰勒级数收敛于 $f \Leftarrow |f^{(n)}(x)|\le M, \forall n\in \mathbb{N}^{\star}, \forall x\in U(x_0, R)$，即 $\{f^{(n)}(x)\}$ 在 (x_0-R,x_0+R) 一致有界

例

这个例 8 有点生成函数的味道？

$f(x)=\frac{1}{1-x-2x^2}=\frac{1}{3}(\frac{1}{1+x}+\frac{2}{1-2x})=\frac{1}{3}\sum\limits_{n=0}^{\infty}(-1)^nx^n + \frac{2}{3} \sum\limits_{n=0}^{\infty}2^nx^n$

应用

求和、求导、求积

用各种基本式子去凑 ..

看起来好难啊

---

13 Fourier 级数

$y=A_0 + \sum\limits_{n=1}^{\infty}A_n\sin(n\omega t+\varphi_n)$

13.1 周期函数的 Fourier 级数

“ 一切周期函数都可展成三角函数的无穷级数 ”

三角级数

$y=\frac{a_0}{2} + \sum\limits_{n=1}^{\infty}(a_n\cos nx+b_n \sin nx)$

三角函数系及其正交性

三角函数系

$1, \cos x, \sin x, \cos 2x, \sin 2x, \ldots$

正交

任两个不同函数的乘积在 $[-\pi, \pi]$ 上的积分为 0.

（积化和差 和差化积）

$\displaystyle\int_{-\pi}^{\pi} \sin mx \sin nx \mathrm{d}x = \pi \delta_{mn}=\begin{cases}0, m\neq n\\\pi, m=n\end{cases}$

傅里叶级数

傅里叶系数

$\displaystyle\int_{-\pi}^{\pi}f(x)\mathrm{d}x = \int_{-\pi}^{\pi}\frac{a_0}{2}\mathrm{d}x + \int_{-\pi}^{\pi} [\sum\limits_{k=1}^{\infty}(a_k\cos kx+b_k\sin kx)]\mathrm{d}x=a_0\pi\iff a_0 = \frac{1}{\pi}\int_{-\pi}^{\pi} f(x)\mathrm{d}x$

$\displaystyle\int_{-\pi}^{\pi}f(x)\cos nx\mathrm{d}x = \frac{a_0}{2}\int_{-\pi}^{\pi}\cos nx\mathrm{d}x + \sum\limits_{k=1}^{\infty}(a_k\int_{-\pi}^{\pi}\cos kx\cos nx\mathrm{d}x+b_k\int_{-\pi}^{\pi}\sin kx\cos nx\mathrm{d}x)=a_n\int_{-\pi}^{\pi} \cos^2 nx \mathrm{d}x = a_n\pi\iff a_n = \frac{1}{\pi}\int_{-\pi}^{\pi}f(x)\cos nx\mathrm{d}x$

同理 $b_n = \frac{1}{\pi}\int_{-\pi}^{\pi}f(x)\sin nx\mathrm{d}x$

傅里叶级数

若 f 是以 2π 为周期的可积或绝对可积函数，那么 $f\sim \frac{a_0}{2} + \sum\limits_{n=1}^{\infty}(a_n\cos nx+b_n \sin nx)$.

分段可微

f 定义在 $[a, b]$ 上，若存在 $[a, b]$ 的一个分割，使得 f 在分割出的区间对应的开区间中分别可微，则称 f 在 $[a, b]$ 上是分段可微的。

Fourier 收敛条件

若 f 以 2π 为周期，在 $[-\pi,\pi]$ 上分段可微，那么 f 的 Fourier 级数在 $\forall x_0$ 处收敛于 $\frac{f(x_0+0)+f(x_0-0)}{2}$.

推论 f 在 $[-\pi, \pi]$ 有一阶导数 $\Rightarrow f$ 可展成 Fourier 级数。

正弦级数与余弦级数

定义在 [-\pi, \pi] 上时

$\displaystyle\mathbf{Th.}$

（1）当周期为 2π 的奇函数 $f(x)$ 展开成傅里叶级数时，其系数为

$$\begin{cases} a_n = 0, &(n = 0, 1, 2, \ldots)\\ b_n = \frac{2}{\pi}\int_{0}^{\pi}f(x)\sin nx \mathrm{d}x, &(n = 1, 2, \ldots) \end{cases}$$

（2）当周期为 2π 的偶函数 $f(x)$ 展开成傅里叶级数时，其系数为

$$\begin{cases} a_n = \frac{2}{\pi}\int_{0}^{\pi}f(x)\cos nx \mathrm{d}x, &(n = 0, 1, 2, \ldots)\\ b_n = 0, &(n = 1, 2, \ldots) \end{cases}$$

$\displaystyle\mathbf{Def.}$

若 $f(x)$ 为奇函数，其傅里叶级数称为正弦级数。
若 $f(x)$ 为偶函数，其傅里叶级数称为余弦级数。

定义在 [0, \pi] 上时

将其延拓。

奇延拓$g(x)=-f(-x)$
偶延拓$g(x)=f(-x)$

周期为 2L 的傅里叶级数

变量置换 $\frac{\pi x}{L} = t$

$F(t) = f(\frac{Lt}{\pi})$

$f(x) = \frac{a_0}{2}+\sum\limits_{n=1}^{\infty}(a_n\cos\frac{n\pi x}{L}+b_n\sin\frac{n\pi x}{L})$

13.2 Fourier 级数的逐点收敛

Dirichlet 积分

f 是以 2π 为周期的可积或绝对可积函数。

记 $S_n(x_0)=\frac{a_0}{2}+\sum\limits_{k=1}^{n}(a_k\cos kx_0+b_k\sin kx_0)$

$$S_n(x_0) = \frac{1}{2\pi}\int_{-\pi}^{\pi}f(x)\mathrm{d}x + \sum\limits_{k=1}^{n}\frac{1}{\pi}\int_{-\pi}^{\pi}f(x)(\cos kx\cos kx_0+\sin kx\sin kx_0)\mathrm{d}x$$ $$=\frac{1}{\pi}\int_{-\pi}^{\pi}f(x)(\frac{1}{2}+\sum\limits_{k=1}^{n}\cos k(x-x_0))\mathrm{d}x$$
$$=\frac{1}{\pi}\int_{-\pi}^{\pi}f(x)(\frac{\sin(n+\frac{1}{2})(x-x_0)}{2\sin\frac{x-x_0}{2}})\mathrm{d}x$$
$$=\frac{1}{\pi}\int_{-\pi}^{\pi}f(t+x_0)(\frac{\sin(n+\frac{1}{2})t}{2\sin\frac{t}{2}})\mathrm{d}x$$
$$=\frac{1}{\pi}\int_{0}^{\pi}(f(t+x_0)+f(x_0-t))(\frac{\sin(n+\frac{1}{2})t}{2\sin\frac{t}{2}})\mathrm{d}x $$

狄利克雷积分、狄利克雷积分核

Riemann-Lebesgue 引理

$\displaystyle\mathbf{Th.\ \ 13.1:}$ **(R-L 引理)**

若 f 在 $[a, b]$ 上可积或绝对可积，那么：

$\displaystyle\lim\limits_{\lambda\to +\infty}\int_{a}^{b}f(x)\cos \lambda x \mathrm{d}x=0$

$\displaystyle\lim\limits_{\lambda\to +\infty}\int_{a}^{b}f(x)\sin \lambda x \mathrm{d}x=0$

$\displaystyle\mathbf{Th.\ \ 13.2:}$

若 f 在 $[-\pi, \pi]$ 上可导，f' 在 $[-\pi, \pi]$ 上可积或绝对可积，如果 $f(-\pi)=f(\pi)$，那么：

$a_n=o(\frac{1}{n}), b_n=o(\frac{1}{n}), n\to \infty$

$\displaystyle\mathbf{Th.\ \ 13.3:}$

若 f 在 $[-\pi, \pi]$ 上有 $k+1$ 阶导数，$f^{(n+1)}$ 在 $[-\pi, \pi]$ 上可积或绝对可积，如果 $f(-\pi)=f(\pi), f'(-\pi)=f'(\pi),\ldots, f^{(k)}(-\pi)=f^{(k)}(\pi)$，那么：

$a_n=o(\frac{1}{n^{k+1}}), b_n=o(\frac{1}{n^{k+1}}), n\to \infty$

收敛定理

由 R-L 引理，Dirichlet 积分收敛。

傅里叶级数的局部化定理

f 是以 2π 为周期的可积或绝对可积函数，那么 f 的傅里叶级数在点 x_0 是否收敛以及收敛到何数值，仅与 f 在 x_0 附近的取值有关。

Dini 判别法

$\displaystyle\mathbf{Th.\ \ 13.5:}$

若 f 以 2π 为周期，且在 $[-\pi, \pi]$ 上可积或绝对可积，对 $s\in \mathbb{R}$，令：

$\displaystyle\varphi(t)=f(x_0+t)+f(x_0-t)-2s$,

若 $\exists\ \delta>0, \mathrm{s.t.} \frac{\varphi(t)}{t}$ 在 $[0, \delta]$ 上可积或绝对可积，那么 f 的 Fourier 级数在 x_0 处收敛于 s。

$\displaystyle\mathbf{Th.\ \ 13.7:}$

若 f 以 2π 为周期，且在 $[-\pi, \pi]$ 上可积或绝对可积，若 f 在 x_0 处存在导数，或者有两个有限的单侧导数，那么其傅里叶级数在 x_0 处收敛于 $f(x_0)$.

$\displaystyle\mathbf{Def.\ \ 13.2:}$

若 f 在 $U^{o}(x_0)$ 内有定义，若存在 $\delta > 0, L>0, \alpha > 0$，使得当 $t\in (0, \delta]$ 时有

$|f(x_0+t)-f(x_0+0)|\le Lt^{\alpha}$,
$|f(x_0-t)-f(x_0-0)|\le Lt^{\alpha}$,

则称 f 在 $U^{o}(x_0)$ 内满足 α 阶 Lipschitz 条件。

$\displaystyle\mathbf{Th.\ \ 13.6:}$

若 f 以 2π 为周期，且在 $[-\pi, \pi]$ 上可积或绝对可积，且 f 在 $U^{o}(x_0)$ 内满足 α 阶 Lipschitz 条件，那么 f 的傅里叶级数在 x_0 处收敛。

---

14 多元函数的极限与连续

14.1 Euclid 空间的点集及基本概念

n 维向量空间

集合 $\mathbb{R}^n$定义了加法，数乘

Euclid 空间

定义

在向量空间 $\mathbb{R}^n$ 上定义了内积的空间。

$\displaystyle\langle \boldsymbol{x},\boldsymbol{y}\rangle=\sum\limits_{i=1}^{n}x_iy_i$

1. 半正定性 $\langle \boldsymbol{x}, \boldsymbol{x}\rangle\ge 0$
2. 对称性 $\langle \boldsymbol{x}, \boldsymbol{y}\rangle = \langle \boldsymbol{y}, \boldsymbol{x}\rangle$
3. 线性性 $\forall \lambda,\forall \mu, (\langle \lambda\boldsymbol{x}+\mu \boldsymbol{y}, \boldsymbol{z}\rangle = \lambda\langle \boldsymbol{x}, \boldsymbol{z}\rangle+\mu\langle \boldsymbol{y}, \boldsymbol{z}\rangle)$

Cauchy-Schwartz 不等式

$\displaystyle\langle \boldsymbol{x}, \boldsymbol{y}\rangle^2\le \langle \boldsymbol{x}, \boldsymbol{x}\rangle\langle \boldsymbol{y}, \boldsymbol{y}\rangle$

范数

定义

$\displaystyle\mathbf{Def.\ \ 14.1.1}$

$\displaystyle\|\boldsymbol{x}\|=\sqrt{\langle \boldsymbol{x}, \boldsymbol{x}\rangle}$称向量 $\boldsymbol{x}$ 的范数。

1. 正定性 $\|\boldsymbol{x}\|\ge 0$
2. 保数乘 $\|\lambda \boldsymbol{x}\|=|\lambda|\|\boldsymbol{x}\|$
3. 三角不等式 $\|\boldsymbol{x}+\boldsymbol{y}\|\le\|\boldsymbol{x}\|+\|\boldsymbol{y}\|$

推论

$|\langle \boldsymbol{x}, \boldsymbol{y}\rangle|\le \|\boldsymbol{x}\|\|\boldsymbol{y}\|$

$\displaystyle\|\boldsymbol{x}+\boldsymbol{y}\|^2\le(\|\boldsymbol{x}\|+\|\boldsymbol{y}\|)^2$

夹角

$\displaystyle\cos\theta(\boldsymbol{x}, \boldsymbol{y})=\frac{\langle \boldsymbol{x}, \boldsymbol{y}\rangle}{\|\boldsymbol{x}\|\|\boldsymbol{y}\|}$

距离

$\displaystyle\mathbb{R}^2$ 上定义 $\boldsymbol{x}, \boldsymbol{y}$ 之间距离为 $\|\boldsymbol{x}-\boldsymbol{y}\|$

开球

$\displaystyle\mathbf{Def.\ \ 14.1.2}$

开球$B_r(\boldsymbol{a})=\{\boldsymbol{x}\in \mathbb{R}^n|\ \|\boldsymbol{x}-\boldsymbol{a}\|<r\}$

点列收敛

$\displaystyle\mathbf{Def.\ \ 14.1.3}$

$\displaystyle\{\boldsymbol{x}_k\}\subset \mathbb{R}^n$

$\displaystyle\exists \boldsymbol{a}\in\mathbb{R}^n,\forall \varepsilon>0,\exists K\in \mathbb{N}^{\star},\forall k>K, \mathrm{s.t.} \|\boldsymbol{x}_k-\boldsymbol{a}|<\varepsilon$则称点列 $\{\boldsymbol{x}_k\}$ 收敛于 $\boldsymbol{a}$记为 $\lim\limits_{k\to\infty}\boldsymbol{x}_k=\boldsymbol{a}$称 $\boldsymbol{a}$ 为点列的极限。

若对每一分量都有 $\lim\limits_{k\to \infty}x_{i, k}=a_i$称点列 $\{\boldsymbol{x}_k\}$ 按分量收敛于 $\boldsymbol{a}$

$\displaystyle\mathbf{Th.\ \ 14.1.1}$

点列收敛于 $\boldsymbol{a} \iff$ 点列按分量收敛于 $\boldsymbol{a}$.

柯西收敛定理

$\displaystyle\mathbf{Def.\ \ 14.1.4\quad \text{基本列}}$

基本一样，不记了

$\displaystyle\mathbf{Th.\ \ 14.1.2\quad \text{柯西收敛定理}}$

点列收敛 $\iff$ 点列是基本列

开集与闭集

$\displaystyle\mathbf{Def.\ \ 14.1.5\quad \text{开集}}$

$E\subset\mathbb{R}^n$若 $\forall \boldsymbol{x}\in E, \exists \varepsilon>0, \mathrm{s.t.}\ B_{\varepsilon}(\boldsymbol{x})\subset E$则称 E 为开集。

若一个集合的补集是开集，则该集合是闭集。

约定 $\mathbb{R}^n$ 和 $\varnothing$ 既是开集也是闭集。

$\displaystyle\mathbf{Prop.\ \ 14.1.1}$

有限多个开集的交仍是开集，任意多个开集的并仍是开集。

有限多个闭集的并仍是并集，任意多个闭集的交还是闭集。

内点、外点、边界点

$\displaystyle\mathbf{Def.\ \ 14.1.6}$

设 $E\subset \mathbb{R}^n, \boldsymbol{x}\in\mathbb{R}^n$,

1. $\exists B_{\varepsilon}(\boldsymbol{x})\subset E \iff \boldsymbol{x}$ 为 E 的内点
2. $\exists B_{\varepsilon}(\boldsymbol{x})\subset E^{c} \iff \boldsymbol{x}$ 为 E 的外点
3. $\forall B_{\varepsilon}(\boldsymbol{x}), \exists \boldsymbol{p},\boldsymbol{q}\in B_{\varepsilon}(\boldsymbol{x}), \mathrm{s.t.}\ \boldsymbol{p}\in E, \boldsymbol{q}\notin E\iff \boldsymbol{x}$ 为 E 的边界点

内点的全体称为 E 的内部，记为 E°

边界点构成的集合称 E 的边界，记为 ∂E

聚点

$\displaystyle\mathbf{Def.\ \ 14.1.7\quad \text{聚点}}$

$\displaystyle\boldsymbol{a}$ 为聚点 $\iff E\subset \mathbb{R}^n, \boldsymbol{a}\in

$\mathbb{R}^n, \forall \varepsilon > 0, \exists \boldsymbol{p}\in ((B_{\varepsilon}(\boldsymbol{a}))\cap E)$

$\displaystyle\boldsymbol{a}$ 为孤立点 $\iff \lnot (\boldsymbol{a}$ 为聚点$)$

导集、闭包

$\displaystyle\mathbf{Def.\ \ 14.1.8}$

聚点全体称为导集，记为 E'

$\displaystyle\bar{E}=E\cup E'$ 称为 E 的闭包。

$\displaystyle\mathbf{Th.\ \ 14.1.3}$

集合 E 是闭集 $\iff E' \subset E$

$\displaystyle\mathbf{Th.\ \ 14.1.4}$

集合 E 是闭集 $\iff \forall \{\boldsymbol{a}_n\}\subset E, (\lim\limits_{n\to \infty}\boldsymbol{a}_n)\in E$ （收敛时）

$\displaystyle\mathbf{Th.\ \ 14.1.5}$

集合 E 的导集与闭包均为闭集。

连续曲线、道路连通

$\displaystyle\mathbf{Def.\ \ 14.1.9}$

设 E 是 $\mathbb{R}^n$ 中的点集，若任给 $\boldsymbol{p}, \boldsymbol{q} \in E$存在 E 中的连续曲线将两者联结，称 E 是道路连通的。

连续映射$\varphi = (\varphi_1(t), \cdots, \varphi_n(t)): [a, b]\to \mathbb{R}^n$

若所有的 $\varphi_i(t)$ 都连续，那么称 φ 是一个连续映射，它的像为一条连续曲线。

$\displaystyle\mathbf{Def.\ \ 14.1.10}$

$\displaystyle\mathbb{R}^n$ 中道路连通的开集称为（开）区域，区域的闭包称为闭区域。

14.2 Euclid 空间的基本定理

闭集套定理

$\displaystyle\mathbf{Th.\ \ 14.2.1}\text{（闭集套定理）}$

设 $\{E_k\}$ 是 $\mathbb{R}^n$ 上的非空闭集序列，满足 $E_1\supset E_2\supset \cdots \supset E_k\supset E_{k+1}\cdots$且 $\lim\limits_{k\to \infty}\mathrm{diam}\ E_k=0$则

$\mathop{\cap}\limits_{k=1}^{\infty}E_k$ 中只有唯一的一点。

$\displaystyle\mathrm{diam}\ E = \sup\{\|\boldsymbol{x}, \boldsymbol{y}\|, \boldsymbol{x}, \boldsymbol{y}\in E\}$称 E 的直径。

列紧性定理（Bolzano-Weierstrass）

$\displaystyle\mathbf{Th.\ \ 14.2.2}\text{（列紧性定理）}$

$\displaystyle\mathbb{R}^n$ 上有界点列 $\{x_k\}$ 必有收敛子列。

紧致集

$\displaystyle\mathbf{Def.\ \ 14.2.1}\text{（紧致集）}$

设 S 为 $\mathbb{R}^n$ 上点集，若 $\mathbb{R}^n$ 中一组开集 $\{U_\alpha\}$ 满足 $\cup_\alpha U_\alpha \supset S$那么称 $\{U_\alpha\}$ 为 S 的一个开覆盖。

若 S 的任意一个开覆盖 $\{U_\alpha\}$ 中总存在一个有限子覆盖覆盖 S则称 S 为紧致集。

有限覆盖定理

$\displaystyle\mathbf{Th.\ \ 14.2.3}\text{（有限覆盖定理）}$

设 E 为 $\mathbb{R}^n$ 中子集，则以下几条等价：

1. E 为紧致集。
2. E 中任何无穷点列均有收敛子列，且该子列极限仍在 E 中。
3. E 为有界闭集。

14.3 多元函数的极限与连续

定义

$\displaystyle\mathbf{Def.\ \ 14.3.1}\text{（多元函数）}$

$\displaystyle\mathbb{R}^n$ 的子集到 R 的映射 f 称为 n 元函数，其中该子集是 f 的定义域$\{f(\boldsymbol{x})\}\subset R$ 是 f 的值域。

$z=f(\boldsymbol{x})$ 或 $z=f(x_1, \cdots, x_n)$

二元函数一般记作 $z=f(x,y)$

$\displaystyle\mathbf{Def.\ \ 14.3.2}\text{（重极限）}$

$D\subset \mathbb{R}^n$$z=f(\boldsymbol{x})$ 是定义在 D 上的 n 元函

数$\boldsymbol{a}\in\mathbb{R}^n$ 是 D 的一个聚点A 是一个实数。

$\displaystyle\lim\limits_{\boldsymbol{x}\to\boldsymbol{a}}f(\boldsymbol{x})=A\iff \forall \varepsilon>0,\exists \delta>0,\forall \boldsymbol{x}\in B_{\varepsilon}(\boldsymbol{a}),|f(\boldsymbol{x})-A|<\varepsilon$

称 A 为 $f(\boldsymbol{x})$ 在 $\boldsymbol{a}$ 点的重极限。

海涅定理（Heine-Borel）

$\displaystyle\mathbf{Th.\ \ 14.3.1}\text{（海涅定理）}$

$D\subset \mathbb{R}^n$，$z=f(\boldsymbol{x})$ 是定义在 D 上的 n 元函数，则

$\displaystyle\lim\limits_{\boldsymbol{x}\to\boldsymbol{a}}f(\boldsymbol{x})=A\iff \forall \{\boldsymbol{x}_k\}\subset D, \boldsymbol{x}_k\neq \boldsymbol{a}, \boldsymbol{x}_k\to\boldsymbol{a}(k\to\infty)$，都有 $\lim\limits_{k\to \infty}f(\boldsymbol{x}_k)=A$

累次极限

$\displaystyle\mathbf{Def.\ \ 14.3.3}\text{（累次极限）}$

$D\subset \mathbb{R}^n$，$z=f(\boldsymbol{x})$ 是定义在 D 上的二元函数，给定点 (x_0, y_0)，若对于每个固定的$y\neq y_0$，极限 $\lim\limits_{x\to x_0}f(x,y))$ 存在，若极限 $\lim\limits_{y\to y_0}\lim\limits_{x\to x_0}f(x, y)$ 也存在，则称此极限为函数 $f(x, y)$ 在点 (x_0, y_0) 先对 x 后对 y 的累次极限。

$\displaystyle\mathbf{Th.\ \ 14.3.2}$

二元函数 $f(x, y)$ 在某点的重极限与两个累次极限均存在，则它们相等。

连续

$\displaystyle\mathbf{Def.\ \ 14.3.3}\text{（累次极限）}$

$D\subset \mathbb{R}^n$，$z=f(\boldsymbol{x})$ 是定义在 D 上的 n 元函数，给定点 $\boldsymbol{a}\in D$，若$\lim\limits_{\boldsymbol{x}\to \boldsymbol{a}}f(\boldsymbol{x})=f(\boldsymbol{a})$，则称函数 $f(\boldsymbol{x})$ 在 $\boldsymbol{a}$ 点连续。

我们约定 f 在 D 的孤立点也连续。

不连续的点称为间断点。

在定义域上每一点均连续，则称 f 在定义域上连续，或称 f 是定义域上的连续函数。

$\displaystyle\mathbf{Example.\ 14.3.7}\text{}$

行列式函数 $\det: M_{n\times n}\to \mathbb{R}$ 是连续函数。（将 $M_{n\times n}$ 视为 $\mathbb{R}^{n^2}$）

$\displaystyle\mathbf{Example. \ 14.3.8}\text{}$

n 元多项式都是连续函数。

设 $P(\boldsymbol{x}), Q(\boldsymbol{x})$ 为 n 元多项式

$\displaystyle\lim\limits_{\boldsymbol{x}\to\boldsymbol{a}}P(\boldsymbol{x})Q(\boldsymbol{x})=P(\boldsymbol{a})Q(\boldsymbol{a}),
\lim\limits_{\boldsymbol{x}\to\boldsymbol{a}}\frac{P(\boldsymbol{x})}{Q(\boldsymbol{x})}=\frac{P(\boldsymbol{a})}{Q(\boldsymbol{a})}, (Q(\boldsymbol{a})\neq 0)$

14.4 多元函数连续的性质

一致连续

$\displaystyle\mathbf{Def.\ \ 14.4.1}\text{（一致连续）}$

$D\subset \mathbb{R}^n$，$z=f(\boldsymbol{x})$ 是定义在 D 上的 n 元函数，如果 $\forall \varepsilon>0,\exists \delta >0,\forall \boldsymbol{x},\boldsymbol{y}\in D, (\|\boldsymbol{x}-\boldsymbol{y}\|<\delta\Rightarrow |f(\boldsymbol{x})-f(\boldsymbol{y})|<\varepsilon)$，则称函数 f 在 D 上一致连续。

连续映射

$\displaystyle\mathbf{Def.\ \ 14.4.2}\text{}$

$D\subset \mathbb{R}^n$，$\boldsymbol{f}: D\to \mathbb{R}^m$ 是 D 到 $\mathbb{R}^m$ 的映射，给定 $\boldsymbol{x}_0\in D$，如果 $\forall \varepsilon>0,\exists \delta >0,\forall \boldsymbol{x}\in D, (\|\boldsymbol{x}-\boldsymbol{x_0}\|<\delta\Rightarrow |\boldsymbol{f}(\boldsymbol{x})-\boldsymbol{f}(\boldsymbol{x_0})|<\varepsilon)$，则称映射 $\boldsymbol{f}$ 在点 $\boldsymbol{x}_0$ 连续。

连续映射类似定义。

可表示为：

$$\left(\begin{matrix} z_1\\ \vdots\\ z_m \end{matrix}\right)=\left(\begin{matrix} f_1(x_1, \cdots, x_n)\\ \vdots\\ f_m(x_1, \cdots, x_n) \end{matrix}\right)$$

性质

$\displaystyle\mathbf{Th.\ \ 14.4.1}\text{}$

$\displaystyle\boldsymbol{f}: \mathbb{R}^n\to\mathbb{R}^m$ 是连续映射 $\iff \forall f_i$，f_i 是

连续函数。

$\displaystyle\mathbf{Th.\ \ 14.4.2}$

$\displaystyle\boldsymbol{f}: \mathbb{R}^n\to\mathbb{R}^m$以下条件等价。

1. $\boldsymbol{f}$ 是连续映射
2. 对 $\mathbb{R}^n$ 上任意收敛点列 $\boldsymbol{x}_n\to \boldsymbol{x}_0(n\to \infty)$均有 $\boldsymbol{f}(\boldsymbol{x}_n)\to \boldsymbol{f}(\boldsymbol{x}_0)(n\to \infty)$
3. 对任意开集 $E\subset \mathbb{R}^m$$\boldsymbol{f}^{-1}(E)$ 是 $\mathbb{R}^n$ 中开集

$\displaystyle\mathbf{Th.\ \ 14.4.3}$

连续映射将紧致集映射成紧致集。

$\displaystyle\mathbf{Th.\ \ 14.4.4}$

D 为 $\mathbb{R}^n$ 中紧致集f 是 D 上的连续函数，则下列结论成立

1. （有界性f 在 D 上有界。
2. （最值性f 在 D 上可以存在最大值和最小值。
3. f 在 D 上一致连续。

$\displaystyle\mathbf{Th.\ \ 14.4.6}$

连续映射把道路连通集映射为道路连通集。

推论

（1）连续函数将道路连通的紧致集映射成区间。（2）连续函数将闭区域映射成闭区间。

$\displaystyle\mathbf{Th.\ \ 14.4.7}$

D 为 $\mathbb{R}^n$ 中紧致集f 是 D 上的连续函数，则 $\forall y\in \mathbb{R}, (\exists \boldsymbol{x}_1, \boldsymbol{x}_2\in D, y\in[f(\boldsymbol{x}_1), f(\boldsymbol{x}_2)]\Rightarrow \exists \boldsymbol{x}\in D, \mathrm{s.t.}\ y=f(\boldsymbol{x}))$

---

15 多元函数微分学

15.1 全微分与偏导数

全微分

设开集 $D\in\mathbb{R}^n, f: D\to \mathbb{R}$对 D 中给定的点 $\boldsymbol{x}_0$对于 D 中 $\boldsymbol{x}_0$ 附近的点 x如果

$f(\boldsymbol{x})-f(\boldsymbol{x}_0)=\lambda_1\Delta x_1+\lambda_2\Delta x_2+\cdots+\lambda_n\Delta x_n+o(\|\Delta \boldsymbol{x}\|)$

其中$\lambda_1, \cdots, \lambda_n$ 是常数$\Delta \boldsymbol{x}=\boldsymbol{x} - \boldsymbol{x}_0=(\Delta x_1, \cdots, \Delta x_n)$

此时称函数 f 在 $\boldsymbol{x}_0$ 处可微。

线性主要部分称 f 在 $\boldsymbol{x}_0$ 处的全微分，有时也简称为微分。

偏导

$\displaystyle\mathbf{Def.\ \ 15.1.2}$

设开集 $D\in\mathbb{R}^n, f: D\to \mathbb{R}$对 D 中给定的点 $\boldsymbol{x}_0=(x_1, \cdots, x_n)$极限

$\displaystyle\lim\limits_{\Delta x_i\to 0}\frac{f(x_1, \cdots, x_i+\Delta x_i, \cdots, x_n) - f(x_1, \cdots, x_i, \cdots, x_n)}{\Delta x_i}$

存在，则称 f 在 $\boldsymbol{x}_0$ 处关于第 i 个分量可偏导，称该极限为函数 f 在 $\boldsymbol{x}_0$ 处关于 x_i 的偏导数，记为 $\frac{\partial f}{\partial x_i}(\boldsymbol{x_0})$ 或 $f_{x_i}(\boldsymbol{x}_0)$

$\displaystyle\mathrm{d}f(\boldsymbol{x}_0) = \sum\limits_{k=1}^{n}\frac{\partial f}{\partial x_k}(\boldsymbol{x}_0)\mathrm{d}x_k$

处处存在偏导：偏导函数

梯度

设开集 $D\subset \mathbb{R}^n, f: D\to \mathbb{R}$对于 E 中给定的点 $\boldsymbol{x}_0=(x_1, \cdots, x_n)$如果函数 f 在 $\boldsymbol{x}_0$ 处关于每个分量都可偏导，则称向量

$(\frac{\partial f}{\partial x_1}(\boldsymbol{x}_0), \cdots, \frac{\partial f}{\partial x_n}(\boldsymbol{x}_0))$ 为 f 在 $\boldsymbol{x}_0$ 的梯度，记为 $\mathrm{grad}\ f(\boldsymbol{x}_0)$

方向导数

$\displaystyle\boldsymbol{u}$ 为给定的方向$\boldsymbol{x}_0\in D$极限 $\lim\limits_{t\to 0^{+}}\frac{f(\boldsymbol{x}_0+t\boldsymbol{u})-f(\boldsymbol{x}_0)}{t}$ 称为 f 在 $\boldsymbol{x}_0$ 处沿方向 $\boldsymbol{u}$ 的方向导数，记作 $\frac{\partial f}{\partial \boldsymbol{u}}(\boldsymbol{x}_0)$.

二元函数偏导

设 $z=f(x, y)$ 在点 (x_0, y_0) 的某一邻域种有定义，若 $\lim\limits_{\Delta x\to

0}\frac{f(x_0+\Delta x, y_0)-f(x_0, y_0)}{\Delta x}$ 存在，称此极限为函数 $z=f(x, y)$ 在点 (x_0, y_0) 处对 x 的偏导数。

对 y 类似定义。

偏导函数类似定义。

几何意义：

对 x 偏导是曲面被平面 $y=y_0$ 截线在 M_0 处的切线 M_0T_x 对 x 轴的斜率。

对 y 类似。

二元函数全微分

$\displaystyle\mathrm{d}z=\frac{\partial f}{\partial x}\mathrm{d}x+\frac{\partial f}{\partial y}\mathrm{d}y$

三元$\mathrm{d}u=\frac{\partial u}{\partial x}\mathrm{d}x+\frac{\partial u}{\partial y}\mathrm{d}y+\frac{\partial u}{\partial z}\mathrm{d}z$

可微条件

多元函数各偏导存在 $\not \Rightarrow$ 全微分存在

必要条件

在某点可微 $\Rightarrow$ 在该点各偏导存在，且全微分 $\mathrm{d}f = \sum \frac{\partial f}{\partial x_i}\mathrm{d}x_i$

充分条件

如果函数 $z=f(x, y)$ 的偏导数 $\frac{\partial z}{\partial x}, \frac{\partial z}{\partial y}$ 在点 (x_0, y_0) 的某邻域内存在，且均在该点连续，则该函数在该点可微。

各条件关系

各偏导连续 $\Rightarrow$ 函数可微

函数可微 $\Rightarrow$ 函数连续

函数可微 $\Rightarrow$ 函数偏导存在

反例：

1. $f(x, y) = \sqrt{x^2+y^2}$ 上半圆锥
2. $f(x, y) = \begin{cases}\frac{xy}{x^2+y^2}, & x^2+y^2\neq 0\\ 0, &

x^2+y^2=0\end{cases}$

3. $f(x, y) = \begin{cases}\frac{xy}{x^2+y^2}, & (x, y)\neq (0, 0)\\ 0, & (x, y)=(0, 0)\end{cases}$

f 在点 $\boldsymbol{x}_0=(x_1, \cdots, x_n)$ 可微 $\Rightarrow$ 则 f 在 $\boldsymbol{x}_0$ 处沿任意方向 $\boldsymbol{u}$ 的方向导数均存在，且

$\displaystyle\frac{\partial f}{\partial \boldsymbol{u}}=f_{x_1}(\boldsymbol{x}_0)u_1+\cdots+f_{x_n}(\boldsymbol{x}_0)u_n$

这里 $(u_1, u_2, \cdots, u_n)$ 是指向方向 $\boldsymbol{u}$ 的单位向量。

15.2 多变量函数的求导

链式法则

多元函数套一元函数

$u=\phi(t), v=\psi(t)$ 都在 t 可导，函数 $z=f(u, v)$ 在对应点 (u, v) 可微，则复合函数 $z=f[\phi(t), \psi(t)]$ 在对应点 t 可导，其导数可用下列公式计算：

$\displaystyle\frac{\mathrm{d}z}{\mathrm{d}t}=\frac{\partial z}{\partial u}\frac{\mathrm{d}u}{\mathrm{d}t}+\frac{\partial z}{\partial v}\frac{\mathrm{d}v}{\mathrm{d}t}$

多元函数套多元函数

$u=\phi(x, y), v=\psi(x, y)$ 都在 (x, y) 可微】，函数 $z=f(u, v)$ 在对应点 (u, v) 可微】，则复合函数 $z=f[\phi(x, y), \psi(x, y)]$ 在对应点 (x, y) 可微，其导数可用下列公式计算：

$\displaystyle\frac{\partial z}{\partial x}=\frac{\partial z}{\partial u}\frac{\partial u}{\partial x}+\frac{\partial z}{\partial v}\frac{\partial v}{\partial x}$

$\displaystyle\frac{\partial z}{\partial y}=\frac{\partial z}{\partial u}\frac{\partial u}{\partial y}+\frac{\partial z}{\partial v}\frac{\partial v}{\partial y}$

函数 $f(u_1, \ldots, u_m)$ 在对应点 $(u_1, \ldots, u_m)$$u_k(x_1, \ldots, x_n), k=1, 2,\ldots, m$ 在 $(x_1, \ldots, x_n)$ 可微：

$\displaystyle\frac{\partial f}{\partial x_i}=\sum\limits_{k=1}^{m}\frac{\partial f}{\partial u_k}\frac{\partial u_k}{\partial x_i}, i = 1, \ldots, n.$

特殊例子

$z = f(u, x, y), u = \phi(x, y)$

$z = f(\phi(x, y), x, y)$

令 $v = x, w = y$

$\displaystyle\frac{\partial v}{\partial x}=\frac{\partial w}{\partial y} = 1, \frac{\partial w}{\partial x}=\frac{\partial v}{\partial y}=0$

则

$\displaystyle\frac{\partial z}{\partial x}=\frac{\partial f}{\partial u}\frac{\partial u}{\partial x}+\frac{\partial f}{\partial x}$

$\displaystyle\frac{\partial z}{\partial y}=\frac{\partial f}{\partial u}\frac{\partial u}{\partial y}+\frac{\partial f}{\partial y}$

注意区别 $\frac{\partial z}{\partial x}$ 与 $\frac{\partial f}{\partial x}$.

向量值函数的微分□Jacobian 矩阵

$\displaystyle\mathbf{Def.\ \ 15.2.1}$

设向量值函数 $\boldsymbol{f}: D\subset \mathbb{R}^n\to \mathbb{R}^m$□点 $\boldsymbol{x}_0 = (x_1, \cdots, x_n)\in D$□ 若存在 $m\times n$ 阶矩阵 $A=(a_{ij})_{m\times n}$□使得

$\displaystyle\boldsymbol{f}(\boldsymbol{x})-\boldsymbol{f}(\boldsymbol{x}_0)=A\Delta \boldsymbol{x}+r(\Delta \boldsymbol{x})$

$\displaystyle\lim\limits_{\|\Delta \boldsymbol{x}\|\to 0}\frac{\|r(\Delta \boldsymbol{x})\|}{\|\Delta\boldsymbol{x}\|}=0$

则称 $\boldsymbol{f}$ 在 $\boldsymbol{x}_0$ 处可微，并称 $A\Delta \boldsymbol{x}$ 为 $\boldsymbol{f}$ 在 $\boldsymbol{x}_0$ 处的微分，记作 $\mathrm{d}\boldsymbol{f}(\boldsymbol{x}_0)=A\mathrm{d}\boldsymbol{x}$.

$$J\boldsymbol{f}(\boldsymbol{x}_0)=\left[\begin{matrix} \frac{\partial f_1(\boldsymbol{x_0})}{\partial x_1} & \cdots & \frac{\partial f_n(\boldsymbol{x_0})}{\partial x_n} \\ \vdots & \ddots & \vdots \\ \frac{\partial f_1(\boldsymbol{x_0})}{\partial x_1} & \cdots & \frac{\partial f_1(\boldsymbol{x_0})}{\partial x_1} \\ \end{matrix}\right]$$

称为向量值函数 $\boldsymbol{f}$ 在点 $\boldsymbol{x}_0$ 的 Jacobian 矩阵。

映射微分中的 $m\times n$ 阶矩阵就是其 Jacobian 矩阵，因此 $\mathrm{d}\boldsymbol{f}(\boldsymbol{x}_0)=J\boldsymbol{f}(\boldsymbol{x}_0)\mathrm{d}\boldsymbol{x}$

复合映射的微分

设开集 $E\subset \mathbb{R}^l, D\subset \mathbb{R}^m$□映射 $\boldsymbol{g}: E\to D, \boldsymbol{f}:D\to \mathbb{R}^n$□记复合映射为 $\boldsymbol{h}=\boldsymbol{f}\circ \boldsymbol{g}: E\to R_n$.

如果 $\boldsymbol{g}$ 在 $\boldsymbol{u}_0\in E$ 处可微，f 在 $\boldsymbol{x}_0=\boldsymbol{g}(\boldsymbol{u}_0)\in D$ 处可微，则复合映射 $\boldsymbol{h}$ 在 $\boldsymbol{u}_0$ 处可微，且有 $J\boldsymbol{h}(\boldsymbol{u}_0)=J\boldsymbol{f}(\boldsymbol{x}_0)J\boldsymbol{g}(\boldsymbol{u}_0)$

全微分形式不变性（一阶）

$z=f(u, v)$

$\displaystyle\mathrm{d}z=\frac{\partial z}{\partial u}\mathrm{d}u+\frac{\partial z}{\partial v}\mathrm{d}v$

u, v 可为自变量或中间变量。

15.3 多元函数泰勒公式

高阶偏导

$z=f(x,y)$ 的二阶偏导为

（纯偏导）

$\displaystyle\frac{\partial}{\partial x}(\frac{\partial z}{\partial x})=\frac{\partial^2 z}{{\partial x}^2}=f_{xx}(x, y)$

$\displaystyle\frac{\partial}{\partial y}(\frac{\partial z}{\partial y})=\frac{\partial^2 z}{{\partial y}^2}=f_{yy}(x, y)$

（混合偏导）

$\displaystyle\frac{\partial}{\partial y}(\frac{\partial z}{\partial x})=\frac{\partial^2 z}{{\partial x}\partial y}=f_{xy}(x, y)$

$\displaystyle\frac{\partial}{\partial x}(\frac{\partial z}{\partial y})=\frac{\partial^2 z}{\partial y\partial x}=f_{yx}(x, y)$

混合偏导相等条件

若函数 $z=f(x, y)$ 的两个二阶混合偏导数 f_{xy}, f_{yx} 在区域 D 内连续，那么在该区域内这两个二阶混合偏导数必相等。

凸区域

设 $D \subset \mathbb{R}^n$ 是区域。若联结 D 中任意两点的线段都完全属于 D，即对于任意两点 $x_0, x_1\in D, \forall \lambda \in [0, 1]$，有 $x_0+\lambda(x_1-x_0)\in D$，则称 D 为凸区域。

中值定理

二元函数 $f(x, y)$ 在凸区域 D 上可微，则

对于 D 内任意两点 (x_0, y_0) 和 $(x_0+\Delta x, y_0+\Delta y)$至少存在一个 $\theta\in(0, 1)$使得

$f(x_0+\Delta x, y_0+\Delta y) - f(x_0, y_0) = f_x(x_0+\theta \Delta x, y_0+\theta \Delta y)\Delta x + f_y(x_0+\theta \Delta x, y_0+\theta \Delta y)\Delta y$

多元：

设 $D \subset \mathbb{R}^n$ 是凸区域$f:D\to \mathbb{R}$ 可微，任给 $\boldsymbol{a}, \boldsymbol{b} \in D$存在 $\boldsymbol{\xi}\in D$使得：

$f(\boldsymbol{b}) - f(\boldsymbol{a})=Jf(\boldsymbol{\xi})(\boldsymbol{b}-\boldsymbol{a})$$\boldsymbol{\xi}=\boldsymbol{a}+\theta(\boldsymbol{b}-\boldsymbol{a}), \theta\in (0, 1)$

泰勒公式

二元函数

$\displaystyle\mathbf{Th.\ \ 15.3.2}$

设函数 $f(x, y)$ 在点 (x_0, y_0) 的邻域 U 上具有 $k+1$ 阶连续偏导数，那么对于 U 内每一点 $(x_0+\Delta x, y_0+\Delta y)$ 都有

$f(x_0+\Delta x, y_0+\Delta y)=f(x_0, y_0)+(\Delta x\frac{\partial}{\partial x}+\Delta y\frac{\partial}{\partial y})f(x_0, y_0)+\frac{1}{2!}(\Delta x\frac{\partial}{\partial x}+\Delta y\frac{\partial}{\partial y})^2f(x_0, y_0)+\cdots+\frac{1}{k!}(\Delta x\frac{\partial}{\partial x}+\Delta y\frac{\partial}{\partial y})^k f(x_0, y_0)+R_k$

$R_k=\frac{1}{(k+1)!}(\Delta x\frac{\partial}{\partial x}+\Delta y\frac{\partial}{\partial y})^{k+1}f(x_0+\theta\Delta x, y_0+\theta \Delta y), \quad \theta\in(0,1)$ 称为 Lagrange 余项。

$$(\Delta x\frac{\partial}{\partial x}+\Delta y\frac{\partial}{\partial y})^{p}=\sum\limits_{i=0}^{p}C_p^i\frac{\partial^p f}{{\partial x}^{p-i}{\partial y}^i}(x_0, y_0)(\Delta x)^{p-i}(\Delta y)^i$$

> 我觉得这东西其实就是一个算子 …
>
> 只不过这东西要根据 Leibniz 公式来计算
>
> ↑ 好像说了些废话 ..

多元函数

$\displaystyle\mathbf{Th.\ \ 15.3.3}$

设函数 $f(x_1, x_2, \ldots, x_n)$ 在点 $(x_1^0, \ldots, x_n^0)$ 附近具有 $k+1$ 阶连续偏导数，那么该点附近有

$$f(x_1^0+\Delta x_1, x_2^0+\Delta x_2,\ldots, x_n^0+\Delta x_n)=$$ $$f(x_1^0, x_2^0, \ldots, x_n^0) +(\sum\limits_{i=1}^{n}\Delta x_i\frac{\partial}{\partial x_i})f(x_1^0, x_2^0, \ldots, x_n^0)$$ $$+\cdots+\frac{1}{k!}(\sum\limits_{i=1}^{n}\Delta x_i\frac{\partial}{\partial x_i})^k f(x_1^0, x_2^0, \ldots, x_n^0)+R_k $$

$R_k = \frac{1}{(k+1)!}(\sum\limits_{i=1}^{n}\Delta x_i\frac{\partial}{\partial x_i})^{k+1} f(x_1^0+\theta\Delta x_1, x_2^0+\theta\Delta x_2, \ldots, x_n^0+\theta\Delta x_n), \quad \theta \in(0, 1)$

称 Lagrange 余项。

多重指标及指标记号的泰勒公式

称 $\boldsymbol{\alpha}=(\alpha_1, \ldots, \alpha_n)$ 为一个多重指标，记 $|\boldsymbol{\alpha}|=\alpha_1+\cdots+\alpha_n$，$\boldsymbol{\alpha}!=\alpha_1!\alpha_2!\cdots\alpha_n!$。

对 $\boldsymbol{x}=(x_1, \cdots, x_n)$，记 $\boldsymbol{x}^{\boldsymbol{\alpha}}=x_1^{\alpha_1}\cdots x_n^{\alpha_n}$

则 $(x_1+\cdots+x_n)^k=\sum\limits_{|\boldsymbol{\alpha}|=k}\frac{k!}{\alpha!}\boldsymbol{x}^{\boldsymbol{\alpha}}$

使用多重指标 $\boldsymbol{\alpha}$ 的高阶偏导数

$\displaystyle\boldsymbol{D}^{\boldsymbol{\alpha}}f(\boldsymbol{x})=\frac{\partial^{|\boldsymbol{\alpha}|}f}{\partial x_1^{\alpha_1}\partial x_2^{\alpha_2}\cdots\partial x_n^{\alpha_n}}(x)$

$\displaystyle\mathbf{Th.\ \ 15.3.4}$

$D\subset \mathbb{R}^n$ 是凸区域，$f:D\to \mathbb{R}$ 具有 $m+1$ 阶连续偏导数，存在 $\theta \in (0, 1)$ 使得

$$f(\boldsymbol{x}-\boldsymbol{x}_0)=\sum\limits_{k=0}^{m}{\sum\limits_{|\boldsymbol{\alpha}|=k}}{\frac{\boldsymbol{D}^{\boldsymbol{\alpha}}f(\boldsymbol{x}_0)}{\boldsymbol{\alpha}!}}(\boldsymbol{x}-\boldsymbol{x}_0)^{\boldsymbol{\alpha}}+R_m$$

$$R_m={\sum\limits_{|\boldsymbol{\alpha}|=k+1}}{\frac{\boldsymbol{D}^{\boldsymbol{\alpha}}f(\boldsymbol{x}_0+\theta(\boldsymbol{x}-\boldsymbol{x_0}))}{\boldsymbol{\alpha}!}}(\boldsymbol{x}-\boldsymbol{x}_0)^{\boldsymbol{\alpha}}$$

$$f(\boldsymbol{x})=f(\boldsymbol{a})+Jf(\boldsymbol{a})(\boldsymbol{x}-\boldsymbol{a}) +\frac{1}{2}(x_1-a_1, \cdots, x_n-a_n)\left[\begin{matrix} \frac{\partial^2 f(\boldsymbol{a})}{{\partial x_1}^2} & \cdots & \frac{\partial^2 f(\boldsymbol{a})}{{\partial

x_1}\partial x_n}\\ \vdots & \ddots & \vdots \\ \frac{\partial^2 f(\boldsymbol{a})}{\partial x_n\partial x_1} & \cdots & \frac{\partial^2 f(\boldsymbol{a})}{{\partial x_n}^2} \end{matrix}\right]\left(\begin{matrix} x_1-a_1\\ \vdots\\x_n-a_n \end{matrix}\right) $$

其中二次项矩阵一般记作 $Hess(f)=(\frac{\partial^2 f(\boldsymbol{a})}{\partial x_i\partial x_j})_{n\times n}$称为 f 在 $\boldsymbol{a}$ 处的 Hessian 矩阵。

15.4 隐函数定理

隐函数存在唯一性定理

若函数 $F(x, y)$ 满足下列条件：

1. 函数 F 在以 $P_0(x_0, y_0)$ 为内点的某一区域 $D\subset \mathbb{R}^2$ 上连续
2. $F(x_0, y_0) = 0$
3. 在 D 内存在连续的偏导数 $F_y(x, y)$
4. $F_y(x_0, y_0) \neq 0$

则在 P_0 的某邻域 $U(P_0)\subset D$ 内，方程 $F(x, y)=0$ 唯一确定了一个定义在某区间 $(x_0-\alpha, x_0+\alpha)$ 内的函数 $y=f(x)$使得

1. $f(x_0)=y_0, x\in (x_0-\alpha, x_0+\alpha)$ 时 $(x, f(x))\in U(P_0)$ 且 $F(x, f(x))\equiv 0$
2. $f(x)$ 在 $(x_0-\alpha,x_0+\alpha)$ 内连续。

隐函数可微性定理

若函数 $F(x, y)$ 满足隐函数存在唯一性定理钟的 4 个条件，再加上 $F_x(x, y)$ 在 D 内存在且连续，则由方程 $F(x, y)=0$ 所确定的隐函数 $y=f(x)$ 在 $(x_0-\alpha, x_0+\alpha)$ 内有连续的导函数，且 $f'(x)=-\frac{F_x(x, y)}{F_y(x, y)}$

二元隐函数唯一存在与连续可微性定理

若函数 $F(x, y)$ 满足下列条件：

1. 函数 F 在以 $P_0(x_0, y_0, z_0)$ 为内点的某一区域 $D\subset \mathbb{R}^3$ 上连续
2. $F(x_0, y_0, z_0) = 0$
3. 在 D 内存在连续的偏导数 F_x, F_y, F_z
4. $F_z(x_0, y_0, z_0) \neq 0$

则在 P_0 的某邻域 $U(P_0)\subset D$ 内，方程 $F(x, y, z)=0$ 唯一确定了一个定义在某区间 $U((x_0, y_0))\subset \mathbb{R}^2$ 内的连续函数 $z=f(x, y)$使得

1. $f(x_0, y_0)=z_0, (x, y)\in U((x_0, y_0))$ 时 $(x, y, f(x, y))\in U(P_0)$ 且 $F(x, y, f(x, y))\equiv 0$
2. $z=f(x, y)$ 在 $U((x_0, y_0))$ 有连续的偏导数，且 $\frac{\partial z}{\partial x}=-\frac{\partial x}{\partial z}, \frac{\partial z}{\partial y}=-\frac{\partial y}{\partial z}$

隐函数组定理

定义 $$ \frac{\partial (F, G)}{\partial (u, v)} = \left|\begin{matrix} F_u & F_v \\ G_u & G_v \\ \end{matrix}\right|\neq 0 $$

若：

1. 函数 $F(x, y, u, v), G(x, y, u, v)$ 在以 $P_0(x_0, y_0, u_0, v_0)$ 为内点的某一区域 $V\subset \mathbb{R}^4$ 上连续
2. $F(x_0, y_0, u_0, v_0) = G(x_0, y_0, u_0, v_0) = 0$
3. 在 V 内 F, G 存在一阶连续偏导数
4. $\left.{\frac{\partial(F, G)}{\partial(u, v)}}\right|_{P_0} \neq 0$

则在 P_0 的某邻域 $U(P_0)\subset V$ 内，方程 $F(x, y, u, v)=G(x, y, u, v)=0$ 唯一确定了一个定义在某区间 $U((x_0, y_0))\subset \mathbb{R}^2$ 内的两个隐函数 $u=f(x, y), v=g(x, y)$使得

1. $f(x_0, y_0)=u_0, g(x_0, y_0)=v_0$且当 $(x, y)\in U((x_0, y_0))$ 时 $(x, y, f(x, y), g(x, y))\in U(P_0)$ 且 $F(x, y, f(x, y), g(x, y))\equiv 0\equiv G(x, y, f(x, y), g(x, y))$
2. $u=f(x, y), v=g(x, y)$ 在 $U((x_0, y_0))$ 内连续。
3. u, v 在 $U((x_0, y_0))$ 内有一阶连续偏导，且

$\displaystyle\frac{\partial u}{\partial x}=-\frac{1}{J}\frac{\partial (F, G)}{\partial (x, v)}$

$\displaystyle\frac{\partial v}{\partial x}=-\frac{1}{J}\frac{\partial (F, G)}{\partial (u, x)}$

$\displaystyle\frac{\partial u}{\partial y}=-\frac{1}{J}\frac{\partial (F, G)}{\partial (y, v)}$

$\displaystyle\frac{\partial v}{\partial y}=-\frac{1}{J}\frac{\partial (F, G)}{\partial (u, y)}$

15.5 隐函数定理的几何应用

平面曲线的切线与法线

$F(x, y)=0$

切线$y - y_0=f'(x_0)(x-x_0)$

法线$y - y_0=-\frac{1}{f'(x_0)}(x-x_0)$

切线$F_x(x_0, y_0)(x-x_0)+F_y(x_0, y_0)(y-y_0)=0$

法线$F_y(x_0, y_0)(x-x_0)-F_x(x_0, y_0)(y-y_0)=0$

空间曲线的切线与法平面

切线$\frac{x-x_0}{x'(t_0)}=\frac{y-y_0}{y'(t_0)}=\frac{z-z_0}{z'(t_0)}$

法平面$x'(t_0)(x-x_0)+y'(t_0)(y-y_0)+z'(t_0)(z-z_0)=0$

切线：

$$ \frac{x-x_0}{\left.{\frac{\partial(F, G)}{\partial(y, z)}}\right|_{M_0}}=\frac{y-y_0}{\left.{\frac{\partial(F, G)}{\partial(z, x)}}\right|_{M_0}}=\frac{z-z_0}{\left.{\frac{\partial(F, G)}{\partial(x, y)}}\right|_{M_0}} $$

法平面：

$$ (x-x_0)\left.{\frac{\partial(F, G)}{\partial(y, z)}}\right|_{M_0}+(y-y_0)\left.{\frac{\partial(F, G)}{\partial(z, x)}}\right|_{M_0}+(z-z_0){\left.{\frac{\partial(F, G)}{\partial(x, y)}}\right|_{M_0}}=0 $$

曲面的切平面与法线

$F(x, y, z)=0$

切平面：

$F_x(x_0, y_0, z_0)(x-x_0)+F_y(x_0, y_0, z_0)(y-y_0)+F_z(x_0, y_0, z_0)(z-z_0)=0$

法线：

$\displaystyle\frac{x-x_0}{F_x(x_0, y_0, z_0)}=\frac{y-y_0}{F_y(x_0, y_0, z_0)}=\frac{z-z_0}{F_z(x_0, y_0, z_0)}$

15.6 多元函数的极值问题

矩阵的正定性

定义

$\displaystyle\forall \boldsymbol{x}\in \mathbb{R}^n$□都有

$\displaystyle\boldsymbol{x}'A\boldsymbol{x}>0$□则称 A 为正定矩阵。

$\displaystyle\boldsymbol{x}'A\boldsymbol{x}>0$□则称 A 为半正定矩阵。

$\displaystyle\boldsymbol{x}'A\boldsymbol{x}>0$□则称 A 为负定矩阵。

$\displaystyle\boldsymbol{x}'A\boldsymbol{x}>0$□则称 A 为半负定矩阵。

否则属于不定矩阵。

判定

A 正定 $\iff$ 所有顺序主子式大于 0

A 正定 $\iff$ 所有特征值大于 0

A 不定 $\iff a_{11}a_{22}-a_{12}^2<0$.

二元函数的 Hessian 矩阵

函数 $f(x, y)$ 在 P_0 的邻域内有一二阶连续偏导，记 $A=f_{xx}(x_0, y_0), B=f_{xy}(x_0, y_0), C=f_{yy}(x_0, y_0)$并记 $$H_f(P_0)=\left|\begin{matrix}A&B\\B&C\end{matrix}\right|$$ 称为 Hessian 矩阵。

二元函数极值定义

$z=f(x,y)$ 在 (x_0, y_0) 的某邻域内有定义，对邻域内的任一点 (x, y)

均有 $f(x, y)\le f(x_0, y_0)$则称函数在 (x_0, y_0) 有极大值。 均有 $f(x, y)\ge f(x_0, y_0)$则称函数在 (x_0, y_0) 有极小值。

二元函数取得极值的条件

必要条件

$z=f(x,y)$ 在点 (x_0, y_0) 有偏导，且在点 (x_0, y_0) 有极值，则它在该点的偏导数必为零。

稳定点充分条件

$z=f(x,y)$ 在点 $P_0(x_0, y_0)$ 的邻域内有一二阶连续偏导，且 P_0 是 f 的稳定点。

$H_f(P_0)$ 正定时f 在 P_0 取极小值

$H_f(P_0)$ 负定时f 在 P_0 取极大值

$H_f(P_0)$ 不定时f 在 P_0 不取极值

判定条件

记 $A=f_{xx}(x_0, y_0), B=f_{xy}(x_0, y_0), C=f_{yy}(x_0, y_0)$

$AC-B^2>0\Rightarrow$

$a<0\Rightarrow$ 极大值 $, a>0\Rightarrow$ 极小值

$AC-B^2<0\Rightarrow$ 无极值

多元函数

一阶偏导均为零，存在二阶连续偏导。

Hessian 矩阵正定：极小

Hessian 矩阵负定：极大

15.7 条件极值

拉格朗日乘数法

求 $z=f(x, y)$ 在条件 $\varphi(x, y)=0$ 下的可能极值点：
先构造函数 $L(x, y, \lambda) = f(x, y)+\lambda\varphi(x, y)=0$再由
$$\begin{cases}L_x=f_x(x, y)+\lambda\varphi_x(x, y)=0\\ L_y=f_x(x, y)+\lambda\varphi_y(x, y)=0\\ L_\lambda=\varphi(x, y)=0\end{cases}$$
解出 x, y, λ其中 x, y 就是可能的极值点的坐标。

一般形式拉格朗日乘数法

条件组 $\varphi_k(x_1, x_2, \ldots, x_n)=0, k=1, 2, \ldots, m(m<n)$ 的限制下，求 $y=f(x_1, x_2, \ldots, x_n)$ 的极值。

其拉格朗日函数是$L(x_1, x_2,\ldots, x_n, \lambda_1, \lambda_2, \ldots, \lambda_m) = f(x_1, x_2,\ldots, x_n)+\sum\limits_{k=1}^{m}\lambda_k\varphi_k(x_1, x_2,\ldots, x_n)$

设 f 与 φ_k 均在 D 内有连续的一阶偏导，若 $P_0(x_1^{(0)},\ldots, x_n^{(0)})\in D$ 是上述问题的极值点，且 Jacobian 矩阵

$$\left[\begin{matrix} \frac{\partial \varphi_1}{\partial x_1} & \cdots & \frac{\partial \varphi_1}{\partial x_n} \\ \vdots & & \vdots \\ \frac{\partial \varphi_m}{\partial x_1} & \cdots & \frac{\partial \varphi_m}{\partial x_n} \end{matrix}\right] $$

行满秩，则存在 m 个常数 $\lambda_1^{(0)}, \lambda_2^{(0)}, \ldots, \lambda_m^{(0)}$使得 $(x_1^{(0)}, x_2^{(0)}, \ldots, x_n^{(0)}, \lambda_1^{(0)}, \lambda_2^{(0)}, \ldots, \lambda_m^{(0)})$ 为上述拉格朗日函数的稳定点。

判定条件

1. 消去限定条件，得到函数，求此函数 Hessian 矩阵，判断其正定性。
2. $HL(P_0)=\left(\frac{\partial^2L}{\partial x_j\partial x_k}\right)_{P_0}$
    1. $HL(P_0)$ 正定，取条件极小值
    2. $HL(P_0)$ 负定，取条件极大值
    3. 证明：泰勒
3. 确有极值，仅有一个稳定点，在定义域的边界上不取/趋极值，则稳定点就是条件极值点。

16 重积分

16.1 二重积分的定义与基本性质

区域的面积

有界区域 $P\subset\mathbb{R}^2$ 用直线网 T 将其分割。

选取方式：

1. Δ_i 上的点均为 P 的内点
2. Δ_i 上至少有一点为 P 的内点，且 P 的任意边界点均含于某 Δ_i

第一类面积 $s_{_P}(T)$

第二类面积 $S_{_P}(T)\ge s_{_P}(T)$

数集 $\{s_{_P}(T)\}$ 有上确界 $\{s_{_P}(T)\}$ 有下确界。
记 $\underline{I}_{_P}=\sup\limits_{T}\{s_{_P}(T)\}, \overline{I}_{_P}=\inf\limits_{T}\{S_{_P}(T)\}$
易见 $0\le \underline{I}_{_P} \le \overline{I}_{_P}$

称 $\underline{I}_{_P}$ 为 P 的内面积 $\overline{I}_{_P}$ 为 P 的外面积。

若 $\underline{I}_{_P} = \overline{I}_{_P}$ 则称 P 为可求面积的图形，将其共同值作为 P 的面积。

P 可求面积 $\iff \forall \varepsilon>0, \exists T, \mathrm{s.t.}\; S_{_P}(T)-s_{_P}(T)<\varepsilon$

二重积分

$\displaystyle\iint\limits_D f(x, y)\mathrm{d}\sigma = \lim\limits_{\lambda\to 0}\sum\limits_{i=1}^{n}f(\xi_i, \eta_i)\Delta\sigma_i$

直角坐标系下可写为：

$\displaystyle\iint\limits_{D}f(x,y)\mathrm{d}\sigma=\iint\limits_{D}f(x,y)\mathrm{d}x\mathrm{d}y$

二重积分的存在性

$\displaystyle\mathbf{Th.\;\; 16.2.1}$

$f(x, y)$ 在 D 上可积，则 $f(x, y)$ 在 D 上有界。

$\displaystyle\mathbf{Th.\;\; 16.2.2}$

$f(x, y)$ 在 D 上可积 $\iff \lim\limits_{\|T\|\to 0}S(T)=\lim\limits_{\|T\|\to 0}s(T)$

$\displaystyle\mathbf{Th.\;\; 16.2.3}$

$f(x, y)$ 在 D 上可积 $\iff \forall \varepsilon>0, \exists T, \mathrm{s.t.}\;\;S(t)-s(T)<\varepsilon$

$\displaystyle\mathbf{Th.\;\; 16.2.4}$

有界闭域上的连续函数必可积。

$\displaystyle\mathbf{Th.\;\; 16.2.5}$

$f(x, y)$ 是定义在有界闭域上的有界函数，若其不连续点都落在有限条光滑曲线上，则 $f(x, y)$ 在该有界闭域内可积。

二重积分性质

保数乘

$\displaystyle\iint\limits_{D}kf(x,y)\mathrm{d}x\mathrm{d}y=k\iint\limits_{D}f(x,y)\mathrm{d}x\mathrm{d}y$

保加

$\displaystyle\iint\limits_{D}[f(x,y)\pm g(x,y)]\mathrm{d}x\mathrm{d}y=\iint\limits_{D}f(x,y)\mathrm{d}x\mathrm{d}y\pm\iint\limits_{D}g(x,y)\mathrm{d}x\mathrm{d}y$

区域可加性

$\displaystyle\iint\limits_{D}f(x,y)\mathrm{d}x\mathrm{d}y=\iint\limits_{D_1}f(x,y)\mathrm{d}x\mathrm{d}y+\iint\limits_{D_2}f(x,y)\mathrm{d}x\mathrm{d}y$

$(D=D_1\cup D_2, D_1\cap D_2=\varnothing)$

常数函数

面积 $\sigma = \iint\limits_{D}1\mathrm{d}x\mathrm{d}y = \iint\limits_{D}\mathrm{d}x\mathrm{d}y$

保序性

在 D 上 $f(x, y)\le g(x, y)$ 则有

$\displaystyle\iint\limits_{D}f(x,y)\mathrm{d}x\mathrm{d}y\le\iint\limits_{D}g(x,y)\mathrm{d}x\mathrm{d}y$

特别地 $\left|\iint\limits_{D}{f(x,y)\mathrm{d}x\mathrm{d}y}\right|\le

\iint\limits_{D}{\left|f(x,y)\right|\mathrm{d}x\mathrm{d}y}$

估值不等式

在闭区域 D 上 $m\le f(x, y)\le M$，σ 为 D 的面积，则有

$m\sigma\le \iint\limits_{D}f(x,y)\mathrm{d}x\mathrm{d}y\le M\sigma$

二重积分中值定理

在闭区域 D 上 $f(x, y)$ 连续，σ 为 D 的面积，则在 D 上至少存在一点 (ξ, η) 使得

$\displaystyle\iint\limits_{D}f(x,y)\mathrm{d}x\mathrm{d}y= \sigma f(\xi,\eta)$

16.2 二重积分的计算

矩形区域上二重积分计算

累次积分

$D=[a, b]\times[c,d],\; f:D\to \mathbb{R}$，若对 $\forall x\in[a, b]$，$f(x, y)$ 在 $[c, d]$ 上可积，那么可得 $$I(x)=\int_c^df(x, y)\mathrm{d}y,\; x\in[a,b]$$ 若 $I(x)$ 也在 $[a, b]$ 上可积，则得积分

$$\int_a^b I(x)\mathrm{d}x$$ 称为累次积分。记为 $$\int_a^b\mathrm{d}x\int_c^d f(x, y)\mathrm{d}y$$

存在条件

$D=[a, b]\times[c,d],\; f:D\to \mathbb{R}$ 在 D 上可积，且对 $\forall x\in[a, b]$，$\int_c^d f(x, y)\mathrm{d}y$ 都存在，则累次积分存在，且

$$\iint\limits_D f(x, y) \mathrm{d}\sigma=\int_a^b\mathrm{d}x\int_c^d f(x, y)\mathrm{d}y$$

$D=[a, b]\times[c,d],\; f:D\to \mathbb{R}$ 在 D 上可积，且对 $\forall y\in[c, d]$，$\int_a^b f(x, y)\mathrm{d}x$ 都存在，则累次积分存在，且

$$\iint\limits_D f(x, y) \mathrm{d}\sigma=\int_c^d\mathrm{d}y\int_a^b f(x, y)\mathrm{d}x$$

f 在 $D=[a, b]\times[c,d]$ 上连续，则有

$$\iint\limits_D f(x, y) \mathrm{d}\sigma=\int_c^d\mathrm{d}y\int_a^b f(x, y)\mathrm{d}x=\int_a^b\mathrm{d}x\int_c^d f(x, y)\mathrm{d}y$$

一般区域上二重积分计算

x 型区域 $D=\{(x,y)\mid y_1(x)\le y\le y_2(x),a\le x\le b\}$

y 型区域 $D=\{(x,y)\mid x_1(y)\le x\le x_2(y),c\le y\le d\}$

一般将一般区域分解成有限个无公共内点的 x 或 y 型区域处理。

存在定理

$f(x,y)$ 在 x 型区域 D 上连续，$y_1(x), y_2(x)$ 在 $[a, b]$ 上连续，则

$$\iint\limits_D f(x,y)\mathrm{d}\sigma=\int_a^b\mathrm{d}x\int_{y_1(x)}^{y_2(x)}f(x,y)\mathrm{d}y$$

$f(x,y)$ 在 y 型区域 D 上连续，$x_1(y), x_2(y)$ 在 $[c, d]$ 上连续，则

$$\iint\limits_D f(x,y)\mathrm{d}\sigma=\int_c^d\mathrm{d}y\int_{x_1(y)}^{x_2(y)}f(x,y)\mathrm{d}x$$

二重积分的变量变换

简化被积函数

简化积分域（优先）

变量变换公式

$\displaystyle\mathbf{Th.\;\;}$

$f(x, y)$ 在有界闭域 D 上可积，若变换 $T: x=x(u, v), y=y(u,v)$ 将 uv 平面上按段光滑封闭曲线所围的区域 Δ 一对一的映成 xy 平面上的闭区域 D，函数 $x(u, v), y(u, v)$ 在 Δ 内分别具有一阶连续偏导数，且 $J(u, v)=\frac{\partial (x, y)}{\partial (u, v)}\neq 0, \forall (u, v)\in \Delta$，则

$$\iint\limits_{D}f(x, y)\mathrm{d}x\mathrm{d}y=\iint\limits_{\Delta}f(x(u, v), y(u, v))\left|J(u, v)\right|\mathrm{d}u\mathrm{d}v$$

面积变化率 $J=\left|\frac{\partial(x, y)}{\partial(u, v)}\right|$

在 Δ 内个别点上或在一条曲线上为零公式仍成立。

极坐标换元

含有 x^2+y^2 或边界表达式有该项，常用极坐标变换。

$$\iint\limits_{D}f(x, y)\mathrm{d}x\mathrm{d}y=\iint\limits_{\Delta}f(r\cos \theta, r\sin\theta)r\mathrm{d}r\mathrm{d}\theta$$

广义极坐标变换

$$\iint\limits_{D}f(x, y)\mathrm{d}x\mathrm{d}y=\iint\limits_{\Delta}f(ar\cos \theta, br\sin\theta)abr\mathrm{d}r\mathrm{d}\theta$$

16.3 三重积分

定义

$f(x, y, z)$ 是定义在三维空间可求体积的有界闭区域 V 上的函数，A 是某确定常数，若

$$\forall \varepsilon>0, \exists \delta>0, \mathrm{s.t.}\; \forall T, \|T\|<\delta\Rightarrow \left(\forall (\xi_i, \eta_i, \zeta_i)\in V_i, \left|\sum\limits_{i=1}^{n}f(\xi_i, \eta_i, \zeta_i)\Delta V_i-A\right|<\varepsilon\right)$$

则称 $f(x, y, z)$ 在 V 上可积，A 称为 f 在 V 上的三重积分，记为

$$A=\iiint\limits_{V}f(x, y, z)\mathrm{d}V$$

或

$$A=\iiint\limits_{V}f(x, y, z)\mathrm{d}x\mathrm{d}y\mathrm{d}z$$

三重积分的计算

$f(x, y, z)$ 在 $V=[a, b]\times[c,d]\times[e,h]$ 上的三重积分存在，且对任何 $(x, y) \in D, D=[a, b]\times [c, d]$，定积分 $F(y, z) = \int_e^h f(x, y, z)\mathrm{d}z$ 存在，则 $\iint\limits_{D}\mathrm{d}x\mathrm{d}y\int_e^h f(x, y, z)\mathrm{d}z$ 存在，且

$$\iiint\limits_{V}f(x, y, z)\mathrm{d}x\mathrm{d}y\mathrm{d}z=\iint\limits_{D}\mathrm{d}x\mathrm{d}y\int_e^h f(x, y, z)\mathrm{d}z$$

$f(x, y, z)$ 在 $V=[a, b]\times[c,d]\times[e,h]$ 上的三重积分存在，且对任何 $z \in [e, h]$，二重积分 $I(z) = \iint\limits_{D} f(x, y, z)\mathrm{d}x\mathrm{d}y$ 存在，$D=[a,b]\times[c,d]$，则 $\int_e^h \mathrm{d}z\iint\limits_{D} f(x, y, z)\mathrm{d}x\mathrm{d}y$ 存在，且

$$\iiint\limits_{V}f(x, y, z)\mathrm{d}x\mathrm{d}y\mathrm{d}z=\int_e^h \mathrm{d}z\iint\limits_{D} f(x, y, z)\mathrm{d}x\mathrm{d}y$$

$$\iiint\limits_{V}f(x, y, z)\mathrm{d}x\mathrm{d}y\mathrm{d}z=\int_a^b \mathrm{d}x\int_c^d \mathrm{d}y\int_e^h f(x, y, z)\mathrm{d}z$$

例

$\displaystyle\mathbf{Prove:}$ $$\int_0^x

\mathrm{d}v\int_0^v\mathrm{d}u\int_0^uf(t)\mathrm{d}t = \frac{1}{2}\int_0^x(x-t)^2f(t)\mathrm{d}t$$

$\displaystyle\mathbf{Proof:}$

$$\because \int_0^v\mathrm{d}u\int_0^uf(t)\mathrm{d}t=\int_0^v\mathrm{d}t\int_t^v f(t)\mathrm{d}u=\int_0^v (v-t) f(t) \mathrm{d}t$$ $$\therefore \int_0^x \mathrm{d}v\int_0^v\mathrm{d}u\int_0^uf(t)\mathrm{d}t = \int_0^x \mathrm{d}v\int_0^v (v-t) f(t) \mathrm{d}t$$ $$= \int_0^x \mathrm{d}t\int_t^x (v-t) f(t) \mathrm{d}v=\int_0^x \mathrm{d}t\int_t^x (v-t) f(t) \mathrm{d}v$$ $$=\int_0^x \mathrm{d}t\left[\frac{1}{2}(v-t)^2 f(t)\right]_t^x=\frac{1}{2}\int_0^x(x-t)^2 f(t)\mathrm{d}t $$

三重积分的换元

变量变换公式

$f(x, y, z)$ 在有界闭区域 V 上可积，若变换 $T: x=x(u, v, w), y=y(u, v, w), z=z(u, v, w)$将 uvw 空间中的区域 V' 一对一的映成 xyz 空间中的区域 V函数 $x(u, v, w), y(u, v, w), z(u, v, w)$ 及它们的一阶偏导在 V' 内连续，且函数的行列式 $J(u, v, w)=\left|\frac{\partial(x, y, z)}{\partial(u, v, w)}\right|\neq 0, (u, v, w)\in V'$则

$$\iiint\limits_{V}f(x, y, z)\mathrm{d}x\mathrm{d}y\mathrm{d}z=$$ $$\iiint\limits_{V'}f\left(x_{(u, v, w)}, y_{(u, v, w)}, z_{(u, v, w)}\right)\left|J(u, v, w)\right|\mathrm{d}u\mathrm{d}v\mathrm{d}w$$

柱面坐标变换

$$\begin{cases} x=r\cos \theta,\\ y=r\sin \theta,\\ z=z. \end{cases}$$

Jacobian 行列式：

$$J=\frac{\partial(x, y, z)}{\partial(r, \theta, z)}=\left|\begin{matrix} \cos\theta & -r\sin \theta & 0\\ \sin\theta & -r\cos \theta & 0\\ 0 & 0 & 1 \end{matrix}\right|=r$$

$$\iiint\limits_{V}f(x, y, z)\mathrm{d}x\mathrm{d}y\mathrm{d}z=$$ $$\iiint\limits_{V'}f\left(r\cos\theta, r\sin\theta, z\right)r\mathrm{d}r\mathrm{d}\theta\mathrm{d}z$$

球坐标变换

$$\begin{cases} x=r\sin \varphi \cos \theta,\\ y=r\sin \varphi \sin \theta,\\ z=r\cos \varphi. \end{cases}$$

Jacobian 行列式：

$$J=\frac{\partial(x, y, z)}{\partial(r, \varphi, \theta)}= \left|\begin{matrix} \sin\varphi\cos\theta &r\cos\varphi\cos\theta & -r\sin\varphi\sin\theta\\ \sin\varphi\sin\theta &r\cos\varphi\sin\theta & r\sin\varphi\cos\theta\\ \cos\varphi & -r\sin\varphi & 0\\ \end{matrix}\right|=r^2\sin \varphi$$

广义球坐标变换

球坐标变换

$$\begin{cases} x=ar\sin \varphi \cos \theta,\\ y=br\sin \varphi \sin \theta,\\ z=cr\cos \varphi. \end{cases}$$

Jacobian 行列式：

$$J=\frac{\partial(x, y, z)}{\partial(r, \varphi, \theta)}=abcr^2\sin \varphi$$

16.4 重积分应用

曲面方程

显式

$z=z(x, y), (x, y)\in D$

隐式

$F(x, y, z)=0, (x, y, z)\in V$

通常假设 F, F_x, F_y, F_z 在 V 上连续。

曲面在点的法向量的各分量即为偏导。

参数方程

设 Δ 是 uv 平面上的一个区域，则称

$\displaystyle\Sigma: \vec{r}=\vec{r}(u, v), (u, v)\in \Delta$

为曲面的向量方程，其中 $\vec{r}(u, v)\in \mathbb{R}^3$。

如记 $\vec{r}=(x, y, z)$，则 (1) 又可表示成

$$\begin{cases} x=x(u, v)\\ y=y(u, v)\\ z=z(u, v) \end{cases}, \quad (u, v)\in \Delta $$

称此为曲面的参数方程。

曲面面积

方程 $z=f(x, y), (x, y)\in D$ 其中 D 是可求面积的平面有界区域，$f(x, y)$ 在 D 上有连续的一阶偏

导。

$$S=\iint\limits_{D}\sqrt{1+f_x^2+f_y^2}\mathrm{d}x\mathrm{d}y$$

方程$x(u, v), y(u, v), z(u, v),\; (u, v)\in D$$D$ 可求面积x, y, z 在 D 上有一阶连续偏导$\frac{\partial(x,y)}{\partial(u,v)},\frac{\partial(y,z)}{\partial(u,v)},\frac{\partial(z,x)}{\partial(u,v)}$中至少一个不为零，则曲面 S 的面积为

$$\varDelta S=\iint\limits_{D}\sqrt{EG-F^2}\mathrm{d}u\mathrm{d}v,$$

$$E=x_u^2+y_u^2+z_u^2,$$
$$F=x_ux_v+y_uy_v+z_uz_v,$$
$$G=x_v^2+y_v^2+z_v^2.$$

（第一基本量???）

重心

平面区域

$$ \bar{x}=\frac{\iint\limits_{D}x\rho(x, y)\mathrm{d}\sigma}{\iint\limits_{D}\rho(x, y)\mathrm{d}\sigma}, \bar{y}=\frac{\iint\limits_{D}y\rho(x, y)\mathrm{d}\sigma}{\iint\limits_{D}\rho(x, y)\mathrm{d}\sigma} $$

空间区域

$$ \bar{x}=\frac{\iiint\limits_{V}x\rho(x, y, z)\mathrm{d}x\mathrm{d}y\mathrm{d}z}{\iiint\limits_{V}\rho(x, y, z)\mathrm{d}x\mathrm{d}y\mathrm{d}z},$$ $$\bar{y}=\frac{\iiint\limits_{V}y\rho(x, y, z)\mathrm{d}x\mathrm{d}y\mathrm{d}z}{\iiint\limits_{V}\rho(x, y, z)\mathrm{d}x\mathrm{d}y\mathrm{d}z},$$ $$\bar{z}=\frac{\iiint\limits_{V}z\rho(x, y, z)\mathrm{d}x\mathrm{d}y\mathrm{d}z}{\iiint\limits_{V}\rho(x, y, z)\mathrm{d}x\mathrm{d}y\mathrm{d}z} $$

转动惯量

$$J=\iiint\limits_{V}r^2(x, y, z)\rho(x ,y, z)\mathrm{d}x\mathrm{d}y\mathrm{d}z$$

引力

质点 $A(\xi, \eta, \zeta)$

$$ F=F_x\vec{i}+F_y\vec{j}+F_z\vec{k}$$ $$F_x=k\iiint\limits_{V}\frac{x-\xi}{r^3}\rho(x, y, z)\mathrm{d}x\mathrm{d}y\mathrm{d}z,$$ $$F_y=k\iiint\limits_{V}\frac{y-\eta}{r^3}\rho(x, y, z)\mathrm{d}x\mathrm{d}y\mathrm{d}z,$$ $$F_z=k\iiint\limits_{V}\frac{z-\zeta}{r^3}\rho(x, y, z)\mathrm{d}x\mathrm{d}y\mathrm{d}z, $$ $$r=\sqrt{(x-\xi)^2+(y-\eta)^2+(z-\zeta)^2} $$

17 曲线积分

17.1 第一型曲线积分

定义

L 为可求长的曲线弧，函数 $f(x, y)$ 在 L 上有界，用 L 上的点将 L 分割，若极限

$$\lim\limits_{\max \varDelta s_i\to 0}\sum\limits_{i=1}^{n}f(\xi_i, \eta_i)\cdot\varDelta s_i = A$$

且 A 为有限数，取值与分割及取样点的选取无关，则称 $f(x, y)$ 在 L 上可积，称 A 为函数 $f(x, y)$ 在曲线弧 L 上对弧长的曲线积分，或第一型曲线积分，记作

$$\int_L f(x, y) \mathrm{d}s$$

类似地，三维空间上有：

$$\int_L f(x, y, z) \mathrm{d}s$$

存在条件

$f(x, y)$ 在光滑曲线弧 L 上连续时，第一型曲线积分 $\int_L f(x, y)\mathrm{d}s$ 存在。

性质

线性性

$$\int_L \sum c_if_i\mathrm{d}s = \sum c_i\int_L f_i\mathrm{d}s$$

路径可加

$$\int_L f\mathrm{d}s=\sum\int_{L_i}f\mathrm{d}s$$

约定

L 为闭曲线时，函数 $f(x, y)$ 在 L 上的第一型曲线积分记为

$$\oint\limits_L f(x, y)\mathrm{d}s$$

计算

设光滑曲线 $L: \begin{cases}x=\varphi(t),\\y=\psi(t),\end{cases}\;t\in[\alpha, \beta]$□$f(x, y)$ 在 L 上有定义且连续，则：

$$\int_L f(x,y)\mathrm{d}s = \int_\alpha^\beta f[\varphi(t),
\psi(t)]\sqrt{\varphi'^{2}(t)+\psi'^{\,2}(t)}\mathrm{d}t$$

17.2 第二型曲线积分

定义

L 为平面内从点 A 到 B 的一条可求长的曲线弧，函数 $P(x, y), Q(x, y)$ 在 L 上有定义，对 L 的任一分割 T□设小段弧长为 $\varDelta s_i$□分割的细度 $\|T\|=\max\limits_{1\le i\le n}\varDelta s_i$□任取 $(\xi_i, \eta_i)\in \overline{M_{i-1}M_i}$□若极限

$$\lim\limits_{\|T\|\to 0} \sum\limits_{i=1}^{n}P(\xi_i, \eta_i)\varDelta x_i + \lim\limits_{\|T\|\to 0}\sum\limits_{i=1}^{n}Q(\xi_i,\eta_i)\varDelta y_i$$

存在，且与分割 T 及 (ξ_i,η_i) 的取法无关，称此极限为 $P(x, y), Q(x, y)$ 沿有向曲线 L 上的第二型曲线积分，记为：

$$\int_L P(x, y)\mathrm{d}x + Q(x, y)\mathrm{d}y$$

或

$$\int_{AB} P(x, y)\mathrm{d}x + Q(x, y)\mathrm{d}y$$

或

$$\int_L P(x, y)\mathrm{d}x + \int_L Q(x, y)\mathrm{d}y$$

简记为

$$\int_L P\mathrm{d}x+Q\mathrm{d}y$$

如果 L 是封闭的有向曲线，则记为

$$\oint_L P\mathrm{d}x+Q\mathrm{d}y$$

设 $\vec{F}=P\vec{i}+Q\vec{j}, \mathrm{d}\vec{s}=\mathrm{d}x\vec{i}+\mathrm{d}y\vec{j}$

则又可记为

$$\int_L \vec{F}\cdot\mathrm{d}\vec{s}$$

存在条件

P, Q 在有向光滑曲线弧 L 上连续时，第二类曲线积分存在。

推广

$$\int_\Gamma P\mathrm{d}x+Q\mathrm{d}y+R\mathrm{d}z$$

性质

线性性

$$\int_L \left(\sum c_iP_i\right)\mathrm{d}x+\left(\sum c_iQ_i\right)\mathrm{d}y = \sum c_i \left(\int_L P_i\mathrm{d}x+\int_L Q_i\mathrm{d}y\right)$$

曲线段可加性

$$\int_L P\mathrm{d}x+Q\mathrm{d}y = \sum \int_{L_i} P\mathrm{d}x+Q\mathrm{d}y$$

有向性

$$\int_{-L}P\mathrm{d}x+Q\mathrm{d}y=-\int_L P\mathrm{d}x+Q\mathrm{d}y$$

计算

设光滑曲线 $L: \begin{cases}x=\varphi(t),\\y=\psi(t),\end{cases}\;t\in[\alpha, \beta]$参数 t 单调地由 α 变到 β 时，点 $M(x, y)$ 从 A 变到 $B$$\varphi, \psi$ 在 $[\alpha, \beta]$ 上有一阶连续导数$f(x, y)$ 在 L 上有定义且连续，则第二型曲线积分 $\int_L P\mathrm{d}x+Q\mathrm{d}y$ 存在，且

$$ \int_l P\mathrm{d}x+Q\mathrm{d}y =\int_{\alpha}^{\beta} \left(P(\varphi(t), \psi(t))\varphi'(t)+Q(\varphi(t), \psi(t))\psi'(t)\right)\mathrm{d}t $$

联系

$$ \int_{L} P\mathrm{d}x+Q\mathrm{d}y = \int_{L} (P\cos\alpha + Q\cos\beta)\mathrm{d}s $$

注意

被积函数相同，起终点相同，但是路径不同积分结果不一定相同。

17.3 格林公式

17.3.1 平面区域的分类与边界的定向

若 D 内任一闭曲线所围成的部分都属于 D则称 D 为平面单连通区域；否则称为复连通区域。（亏格？）

D 的边界曲线的正方向：人沿边界行走时，区域 D 总在他的左手边。

（逆时针？）

17.3.2 Green 公式

定理

设闭区域 D 由分段光滑的曲线 L 围成，函数 $P(x, y), Q(x, y)$ 在 D 上具有一阶连续偏导，则有

$$ \iint\limits_{D}\left(\frac{\partial Q}{\partial x} - \frac{\partial P}{\partial y}\right)\mathrm{d}x\mathrm{d}y = \oint_{L} P\mathrm{d}x + Q\mathrm{d}y $$

其中 L 是 D 的取正方向的边界曲线。

证明：分块

即证：

$$ \iint\limits_{D}\frac{\partial Q}{\partial x}\mathrm{d}x\mathrm{d}y = \oint_L Q\mathrm{d}y\text{Y 型区域上}$$ $$-\iint\limits_{D}\frac{\partial P}{\partial y}\mathrm{d}x\mathrm{d}y = \oint_L P\mathrm{d}x\text{X 型区域上）}$$

意义

建立了二重积分和曲线积分的一种等式关系

揭示了函数在区域内部与边界间的内在联系

另一种记法：

$$ \iint\limits_{D}\left|\begin{matrix} \frac{\partial}{\partial x} & \frac{\partial}{\partial y}\\ P & Q \end{matrix}\right|\mathrm{d}x\mathrm{d}y= \oint\limits_{L}P\mathrm{d}x+Q\mathrm{d}y $$

17.3.3 应用

若 L 是非封闭曲线，则先补再用。

若 L 所围闭域为 D有奇点则挖掉再用。

17.3.4 曲线积分与路径无关的条件

定义

D 是一个区域，P, Q 在 D 内有一节连续偏导，如果对 D 内任意给定的两点 A, B，以及 D 内从 A 到 B 的任意两条曲线 L_1, L_2，都有 $\int_{L_1}P\mathrm{d}x+Q\mathrm{d}y=\int_{L_2}P\mathrm{d}x+Q\mathrm{d}y$，则称曲线积分 $\int_L P\mathrm{d}x+Q\mathrm{d}y$ 在 D 内与路径无关。

条件

D 是单连通闭区域，若 $P(x, y)$ 和 $Q(x, y)$ 在 D 内有一阶连续偏导，则下列四个条件等价：

1. 沿 D 内任一按段光滑封闭曲线 L，有 $\oint_L P\mathrm{d}x+Q\mathrm{d}y = 0$
2. 在 D 内 $\int_L P\mathrm{d}x+Q\mathrm{d}y$ 与路径无关。
3. 在 D 内存在 $u(x, y)$，使得 $\mathrm{d}u=P\mathrm{d}x+Q\mathrm{d}y$，
4. 在 D 内，$\frac{\partial P}{\partial y}\equiv \frac{\partial Q}{\partial x}$，

全微分方程

若存在 $u(x, y)$，使得 $\mathrm{d}u=P\mathrm{d}x+Q\mathrm{d}y$，则称 $P\mathrm{d}x+Q\mathrm{d}y=0$ 为全微分方程。

当 $P(x, y)$ 和 $Q(x, y)$ 在单连通区域 D 内有一阶连续偏导时，

全微分方程合法 $\iff \frac{\partial P}{\partial y}=\frac{\partial Q}{\partial x}$

---

18 曲面积分

18.1 第一型曲面积分

表示

1. 显式 $z=z(x,y), (x, y)\in D$
2. 隐式 $F(x, y, z)=0, (x, y, z)\in V$（通常假设 F, F_x, F_y, F_z 在 V 上连续）
3. 参数 $\mathit{\Sigma}: \vec{r}=\vec{r}(u, v), (u, v)\in \varDelta$，$\vec{r}(u, v)\in \mathbb{R}^3$，或：

$$ \begin{cases} x=x(u, v),\\ y=y(u, v),\\ z=z(u, v),\\ \end{cases} \quad (u, v)\in \varDelta. $$

面积

$$ z=f(x, y), \, S = \iint\limits_{D}\sqrt{1+f^2_x+f^2_y}\mathrm{d}x\mathrm{d}y $$

参数方程：

$$ \begin{cases} x=x(u, v),\\ y=y(u, v),\\ z=z(u, v),\\ \end{cases} \quad (u, v)\in D. $$

x, y, z 在有界区域 D 上有连续一阶偏导，且 $\frac{\partial(x, y)}{\partial(u,v)}, \frac{\partial(y, z)}{\partial(u,v)}, \frac{\partial(z, x)}{\partial(u,v)}$ 中至少一个不为零，则曲面 S 的面积为

$$ \Delta S=\iint\limits_{D}\sqrt{EG-F^2}\mathrm{d}u\mathrm{d}v, \,$$
$$E=x_u^2+y_u^2+z_u^2, F=x_ux_v+y_uy_v+z_uz_v, G=x_v^2+y_v^2+z_v^2. $$

$\displaystyle\sqrt{EG-F^2}$ 称曲面的第一基本量

定义

$$ \iint\limits_{\Sigma}f(x, y, z)\mathrm{d}S=\lim\limits_{\|T\|\to 0}\sum\limits_{i=1}^{n} f(\xi_i,\eta_i, \zeta_i)\varDelta S_i $$

计算

$\displaystyle\Sigma$ 是正则曲面，参数方程为 $\vec{r}=\vec{v}(u, v), (u,v)\in \varDelta$

函数 $f(x, y, z)$ 在 Σ 上连续，则有

$$ \iint\limits_{\Sigma}f(x, y, z)\mathrm{d}S=\iint\limits_{\varDelta}f\circ\vec{r}\left\|\vec{r}_u\times \vec{r}_v\right\|\mathrm{d}u\mathrm{d}v $$

$z=g(x, y), f$ 在 Σ 上连续，

$$ \iint\limits_{\Sigma}f(x, y, z)\mathrm{d}S=\iint\limits_{\varDelta}f(x, y, z)\sqrt{1+g_x^2+g_y^2}\mathrm{d}u\mathrm{d}v $$

18.2 第二型曲面积分

曲面法向量的指向决定曲面的侧。

单位时间流量元 $\varDelta\varPhi=\vec{v}\cdot\vec{n}\varDelta A$

速度 $\vec{v}$

法向量 $\vec{n}$

定义

$$ \iint\limits_S P\mathrm{d}y\mathrm{d}z+\iint\limits_S Q\mathrm{d}z\mathrm{d}x+\iint\limits_S R\mathrm{d}x\mathrm{d}y=$$ $$\lim\limits_{\|T\|\to 0}\sum\limits_{i=1}^{n}P(\xi_i,\eta_i,\zeta_i)\varDelta S_{i_{yz}}+\lim\limits_{\|T\|\to 0}\sum\limits_{i=1}^{n}Q(\xi_i,\eta_i,\zeta_i)\varDelta S_{i_{zx}}+\lim\limits_{\|T\|\to 0}\sum\limits_{i=1}^{n}R(\xi_i,\eta_i,\zeta_i)\varDelta S_{i_{xy}} $$

计算

$S\colon x=x(y, z),$

$$\iint\limits_S P(x, y, z)\mathrm{d}y\mathrm{d}z=\pm\iint\limits_{D_{yz}}P[x(y, z), y, z]\mathrm{d}y\mathrm{d}z$$

两类积分联系

$z=z(x, y), (x, y)\in D$
$\cos\alpha = \frac{\mp z_x\displaystyle}{\sqrt{1+z_x^2+z_y^2}},$
$\cos\beta = \frac{\mp z_y}{\sqrt{1+z_x^2+z_y^2}},$
\displaystyle$\cos\gamma = \frac{\pm 1}{\sqrt{1+z_x^2+z_y^2}}.$ \displaystyle $$ \iint\limits_{S}P\mathrm{d}y\mathrm{d}z+Q\mathrm{d}z\mathrm{d}x+R\mathrm{d}x\mathrm{d}y =\iint\limits_{S}(P\cos\alpha+Q\cos\beta+R\cos\gamma)\mathrm{d}S $$

参数方程处理

$\displaystyle\vec{r}=\vec{r}(u, v), (u, v)\in \Delta$

$\displaystyle\vec{F}=(P, Q, R)$在 S 上连续

$$
\iint\limits_{S}P\mathrm{d}y\mathrm{d}z+Q\mathrm{d}z\mathrm{d}x+R\mathrm{d}x\mathrm{d}y =\pm \iint\limits_{\varDelta}\vec{F}\circ\vec{r}\cdot(\vec{r}_u\times\vec{r}_v)\mathrm{d}u\mathrm{d}v
$$

18.3 Gauss 公式与 Stokes 公式

Gauss 公式

空间闭区域 V 由分片光滑的双侧封闭曲面 S 围成，函数 P, Q, R 在 V 上连续，且具有一阶连续偏导，则

$$ \iiint\limits_{V}\left(\frac{\partial P}{\partial x}+\frac{\partial Q}{\partial y}+\frac{\partial

R}{\partial z}\right)\mathrm{d}x\mathrm{d}y\mathrm{d}z=\oiint\limits_{S}P\mathrm{d}y\mathrm{d}z+Q\mathrm{d}z\mathrm{d}x+R\mathrm{d}x\mathrm{d}y $$

其中 S 取外侧。此式称高斯公式。

双侧曲面的侧与其边界曲线方向

边界曲线方向与法向量方向根据右手螺旋定则判断。

斯托克斯公式

S 是光滑的双侧曲面，边界曲线 Γ 是按段光滑的连续曲线，若函数 P, Q, R 在 S 连同 Γ 上连续，且有连续的一阶偏导数，则：

$$ \iint\limits_{S} \left(\frac{\partial R}{\partial y}-\frac{\partial Q}{\partial z}\right)\mathrm{d}y\mathrm{d}z +\left(\frac{\partial P}{\partial z}-\frac{\partial R}{\partial x}\right)\mathrm{d}z\mathrm{d}x +\left(\frac{\partial Q}{\partial x}-\frac{\partial P}{\partial y}\right)\mathrm{d}x\mathrm{d}y$$ $$=\oint\limits_{\Gamma} P\mathrm{d}x+Q\mathrm{d}y+R\mathrm{d}z $$

行列式形式

$$ \iint\limits_S \left|\begin{matrix} \mathrm{d}y\mathrm{d}z & \mathrm{d}z\mathrm{d}x & \mathrm{d}x\mathrm{d}y \\\;\\ \frac{\partial}{\partial x} & \frac{\partial}{\partial y} & \frac{\partial}{\partial z} \\\,\\ P & Q & R \end{matrix}\right| =\oint\limits_{\Gamma} P\mathrm{d}x+Q\mathrm{d}y+R\mathrm{d}z $$

18.4 场论

概念

数量场：
$f(x, y, z)$

向量场：
$\vec{F}(x,\displaystyle y, z)=(P(x, y, z), Q(x, y, z), R(x, y, z))$

梯度场

$V\subset\mathbb{R}^3$ 为一开集，函数 f 连续可微。

$$\mathrm{grad}\,f(\vec{p}_0) = \frac{\partial f(\vec{p}_0)}{\partial x}\vec{i}+\frac{\partial f(\vec{p}_0)}{\partial y}\vec{j}+\frac{\partial f(\vec{p}_0)}{\partial z}\vec{k}$$

沿此方向，方向导数取最大值。

Nabla 算子

$$ \nabla = (\frac{\partial}{\partial x}, \frac{\partial}{\partial y}, \frac{\partial}{\partial z}) $$

1. $\nabla (cf)=c\nabla f$
2. $\nabla(f\pm g)=\nabla f\pm \nabla g$
3. $\nabla(fg)=f\nabla g+g\nabla f$
4. $\nabla(\varphi\circ f)=(\varphi' \circ f)\nabla f$

散度场

$\displaystyle\vec{F}(x, y, z)=(P(x, y, z), Q(x, y, z), R(x, y, z))$ 为空间区域 V 上的向量值函数，定义数量函数

$$D(x, y, z)=\frac{\partial P}{\partial x}+\frac{\partial Q}{\partial y}+\frac{\partial R}{\partial z}$$

称为向量函数 $\vec{F}$ 在 (x, y, z) 处的散度，记为 $\mathrm{div}\;\vec{F}$

高斯公式可写为：

$$ \iiint\limits_{V}\mathrm{div}\;\vec{F}\mathrm{d}x\mathrm{d}y\mathrm{d}z=\oiint\limits_S \vec{F}\cdot\mathrm{d}\vec{S} $$

上式两边取某一点 M_0 处的极限，可知 $\mathrm{div}\;\vec{F}(M_0)$ 是流量对体积 V 的变化率。

$\displaystyle\mathrm{div}\;\vec{F}(M_0)>0$流出，称为源

$\displaystyle\mathrm{div}\;\vec{F}(M_0)<0$流入，称为汇

若 $\forall P\in V, \mathrm{div}\;\vec{F}(P)=0$称 $\vec{F}$ 是无源场。

散度可记为 $\mathrm{div}\; \vec{F}=\nabla\cdot\vec{F}$

性质：

1. 线性性
2. $\nabla \cdot\varphi \vec{F}=\varphi \nabla \cdot \vec{F}+\vec{F}\cdot\nabla\varphi$
3. φ 是数量场，则 $\nabla\cdot\nabla\varphi=\frac{\partial^2\varphi}{\partial x^2}+\frac{\partial^2\varphi}{\partial y^2}+\frac{\partial^2\varphi}{\partial z^2}$

记 $\nabla\cdot\nabla=\varDelta$称 Laplace 算子。

若数量场 f 满足 Laplace 方程Laplacian?

$$ \varDelta f=\frac{\partial^2 f}{\partial x^2}+\frac{\partial^2 f}{\partial y^2}+\frac{\partial^2 f}{\partial z^2} = 0 $$

则称 f 是 V 上的调和函数。

旋度场

$\displaystyle\vec{F}(x, y, z)=(P(x, y, z), Q(x, y, z), R(x, y, z))$ 为空间区域 V 上的向量值函数，定义向量函数：

$$ \mathrm{rot} \vec{F} = (\frac{\partial R}{\partial y} - \frac{\partial Q}{\partial z}, \frac{\partial P}{\partial z} - \frac{\partial R}{\partial x}, \frac{\partial Q}{\partial x} - \frac{\partial P}{\partial y}) $$

称其为向量场 $\vec{F}$ 在 (x, y, z) 处的旋度。其形成的场为旋度场。

或记：

$$ \mathrm{rot}=\left|\begin{matrix} \vec{i} & \vec{j} & \vec{k} \\\,\\ \frac{\partial}{\partial x} & \frac{\partial}{\partial y} & \frac{\partial}{\partial z} \\\,\\ P & Q & R \end{matrix}\right| $$

或记：

$$ \mathrm{rot}\, \vec{F} = \nabla \times \vec{F} $$

斯托克斯公式可记为：

$$ \iint\limits_S \mathrm{rot}\,\vec{F}\cdot\mathrm{d}\vec{S} = \oint\limits_\Gamma \vec{F}\cdot\mathrm{d}\vec{s} $$

势

存在 φ 使得 $\mathrm{grad}\,\varphi=\vec{F}$则称向量场 $\vec{F}$ 是有势场。

对含于 V 的任一封闭曲线 $\Gamma$$\oint\limits_{\Gamma}\vec{F}\cdot\mathrm{d}\vec{s} = 0$则称 $\vec{F}$ 是 V 上的一个保守场。

如果 $\mathrm{rot}\,\vec{F}\equiv \vec{0}$则称 $\vec{F}$ 是 V 上的一个无旋场。

上述三个条件等价。

空间曲线积分与路径无关性

空间区域

若 V 内任一封闭曲线皆可以不经过 V 外的点而连续收缩为 V 内的一点，则称 V 为单连通区域。（亏格为 0？同胚于球？）否则称为复连通区域。

路径无关性

$\displaystyle\Omega\subset\mathbb{R}^3$ 是单连通区域P, Q, R 在 Ω 上连续，且有一阶连续偏导，则下列四个条件等价：

1. 对任一按段光滑封闭曲线 $L$$\oint\limits_{L}P\mathrm{d}x+Q\mathrm{d}y+R\mathrm{d}z

$= 0$

2. Ω 内 $\int\limits_{L}P\mathrm{d}x+Q\mathrm{d}y+R\mathrm{d}z$ 与路径无关
3. $\exists u(x, y, z), \mathrm{s.t.}\;(\mathrm{d}u=P\mathrm{d}x+Q\mathrm{d}y+R\mathrm{d}z)$
4. $\frac{\partial P}{\partial y}\equiv\frac{\partial Q}{\partial x},\; \frac{\partial Q}{\partial z}\equiv\frac{\partial R}{\partial y},\;\frac{\partial R}{\partial x}\equiv \frac{\partial P}{\partial z}$