

初等数论三大定理和缩系乘法群

前言

这篇和算法没什么关系，纯粹是基础知识。

初等数论三大定理，指将整个初等数论框架支撑起来的三个定理，分别是Fermat-Euler（费马欧拉）定理、Wilson（威尔逊）定理和Chinese-Residue（中国剩余）定理。

其中FE定理说明取模意义下缩系（简化剩余系/缩剩余系）集合的乘法构成群，Wilson定理揭示了模为素数的乘法群的结构，而CR定理阐述了怎样将群和群结合起来，即多素因子模数乘法群的结构问题。

它们三者的本质，都是解释缩系乘法群的结构问题。而研究缩系乘法群的结构，最终结论的形式是：奇素数幂次群结构、2的幂次群结构、CR定理，三个定理作为最终的最高结论。

Fermat-Euler定理

内容

设欧拉函数 $\varphi(n)$ 是0到n-1里与n互素的数（缩剩余系）的个数，即缩系乘法群的阶。对于缩系中任一元素a有：

$$a^{\varphi(n)} \equiv 1 \pmod{n}$$

特别地，当n是单个素数p的时候 $\varphi(p)$ 是p-1即：（费马小定理）

$$a^{p-1} \equiv 1 \pmod{p}$$

这其实是群论里的定理。任意一个群，群里任意一个元素，自乘群的阶次，一定会回到单位元。即：元素的阶整除群的阶。

证明也简单：对缩系所有元素同时进行乘法操作，构成缩系元素的一个置换。（也可以采用群论中陪集的方法）

这个定理在数学题或者算法中，一般用于简化幂次。例如快速幂函数。

推广

将研究对象转移到缩系以外。在完系（完全剩余系）中，任一元素a有相似结论：

$$a^{t + \varphi\left(\frac{n}{\gcd(a^t, n)}\right)} \equiv a^t \pmod{n}$$

对于足够大的整数t成立。意思是a本身自乘很多次后，也会落入循环中，循环节是n去除 a^t 与n最大公约数的缩系元素个数的约数。

并且这个足够大的t一般要求a与n重合的那部分素因数被“消除”干净了，即 a^t 这部分素因数的幂次已

$$x \equiv 1 \pmod{p^a}$$

$$x \equiv -1 \pmod{p^a}$$

每一个奇素数 p 均如此。现在说明，同余于-1的那部分解一定是偶数个，从而全体乘积模 p^a 余数为1。

仍旧用配对的思想。对于每一个同余于-1的解，找另外一个与它配对的同余于-1的解。

模2的幂的那个维度与它不相关。每有一个模4余1的解，必然也有一个模4余-1的解与它配对。因此是偶数个。

同理，模2的幂的部分也可以采用配对法。含有多个奇素数的情形也同理。

那么最终结果为：

$$\prod_{(a,n)=1} a \equiv \begin{cases} -1 & n=1,2,4,p^a,2p^a, p \text{ is odd prime} \\ 1 & \text{otherwise} \end{cases}$$

注：推理中容易犯的错误是，尽管一个缩系的乘积模某个分量的结果可能是-1，但是在最终得数中含有的分量缩系可能不止一个。

中国剩余定理

很简单，不同素因子幂乘起来，对应于缩系乘法群的笛卡尔积。因此缩系乘法群的总体构成一个空间，各个素因子的缩系乘法群互不相干，分别构成相应的维度。

当已知这个数在各个维度的坐标，想求这个数的时候，利用线性代数的知识，先求各个维度上的单位向量，然后向量点乘即可。

单位向量的求法，就是一次不定方程。

缩系乘法群的结构

有个经典事实：群的结构与这个素数是不是2有关，当素数是2的时候群的结构会更加复杂。

模为奇素数幂

构成循环群。生成元叫做原根。

不止这类模有原根，事实上1、2、4、奇素数的幂、2倍奇素数的幂都有，也就是说这些缩系乘法群也是循环群，而其余的模都没有。

模为2的幂

当为1、2、4的时候，仍旧是循环群。

当大于等于8的时候，变为一个循环群（元素数为这个数除以4）与 $\{-1,1\}$ 乘法群的笛卡尔积。

著名的Klein四元群与模8的缩系乘法群同构。

像是模2的幂（至少为8），一般对数不能直接引入，因为缩系乘法群是一个循环群与{-1,1}乘法群的笛卡尔积，不是循环群。但是也有办法：

{-1,1}乘法群方向坐标分量：如果a为4k+1形式的数，该方向分量为1；如果a为4k+3形式的数，该方向分量是-1。

因此，对于模2的幂（至少为8）缩系乘法群，只取它的一半，即留下4k+1形式的一半，则构成循环群，可以引入离散对数。此时始终有固定的生成元为5。那么所有4k+1形式的整数都可以求出以5为底的对数。由于底数都给定了，这个对数的求解甚至都可能写出固定的公式，所以不可能用于加密。

另一半4k+3形式的数怎么办？由于大背景是模2的幂（至少为8），每一个4k+3形式的数都是4k+1形式的数乘一个-1。根据对数将乘法变为加法，问题转化为如何定义：

$$\log_5(-1) \equiv c \pmod{2^k}$$

那么这个东西就很玄妙了。如果希望这个新的离散对数具有两个维度的周期，我们可以借助复数来解决这个问题。而与此同时，我们仍旧希望换底公式是成立的。经过尝试，强行将此式定义为：

$$\log_5(-1) \equiv c-3i \pmod{2^k}$$

（当c为3，即模数为8的时候，定义为1+i——当然这实在没什么用，因为它同构于Klein四元群，习惯采用别的处理方法）

例如模16，有4个“生成元”（只能跑遍半个缩系）3、5、11、13，可以列表验证换底公式（验算不妨将除法改为计算乘法）仍然成立：

n mod 16	1	9	5	13	3	11	7	5
$\log_3 n \pmod{16}$	0	2	3+2i	1+2i	1	3	2+2i	2i
$\log_{11} n \pmod{16}$	0	2	1+2i	3+2i	3	1	2+2i	2i
$\log_5 n \pmod{16}$	0	2	1	3	3+2i	1+2i	2+2i	2i
$\log_{13} n \pmod{16}$	0	2	3	1	1+2i	3+2i	2+2i	2i

利用复平面上两个维度同时取模（取模构成矩形）意义下的除法，换底公式仍旧成立。虽然完备，只是这么定义没什么实际用途罢了。

计算模2的幂以5为底给定元素的对数

这里给一个算法，计算模2的t次幂缩系中一个元素a以5为底的对数。要求a必须为4k+1形式，因为5的幂在这个缩系乘法群中只能跑遍一半。

（如果a是4k+3形式，就计算-a）

首先，类似于快速幂的思想，先计算5、5^2、5^4.....在模2的t次幂意义下的值，总共有t-3个，因为：

$$5^{2^{t-2}} \equiv 1 \pmod{2^t}$$

有规律：5是4k+1形式，5^2是8k+1形式，5^4是16k+1形式.....。

在模2的幂缩系中4k+1形式的数以5为底的对数是奇数，8k+1形式的数以5为底的对数恰好被2整除（不被4整除），16k+1形式以5为底的对数恰好被4整除。

因此，对数计算算法设计非常简单：

第一步：计算a-1在二进制下末尾含多少个0，假设含h个。由于a是4k+1形式，h至少为2。这意味着a以5为

底的对数恰好被 2^{h-2} 整除。

第二步：因为取模下除法（数论倒数）不好计算，因此改算取模乘法。用 a 乘上 $5^{2^{h-2}}$ 得到 b 那么 $b-1$ 当中 2 的幂次一定比 $a-1$ 要高。

第三步：如果新的 b 为 1 ，则跳出循环，否则用 b 代替 a 回到第一步重新执行。

循环中记录下每一个 $h-2$ 这些 $h-2$ 是单调递增的。

循环结束后，我们得到一个二进制数：在每个得到的 $h-2$ 处为 1 ，其它处为 0 。因为我们使用了乘法而不是除法，最后用 2^{t-2} 减去得到的二进制数，就得到了所求的对数。

From: <https://wiki.cvbbacm.com/> - CVBB ACM Team

Permanent link: <https://wiki.cvbbacm.com/doku.php?id=2020-2021:teams:namespace:> 群 <https://wiki.cvbbacm.com/doku.php?id=2020-2021:teams:namespace:> 1592446487

Last update: 2020/06/18 10:14