

剩余和互反律

剩余问题、互反律问题，是初等数论计划系列的最后一篇。

这一篇是前三篇的集大成者，基本上会应用到前三篇的所有知识。如果您阅读本文有困难，可以参考前三篇的内容：

[初等数论三大定理和缩系乘法群](#)中的缩系乘法群部分。

[素数幂次与p进数问题](#)中的p进数部分。

[二次域及有理逼近相关问题](#)中的高斯整数与艾森斯坦整数部分以及二次域部分。

至此，初等数论中，除了数论函数（我还不太会）的部分，其余的部分全部成体系按线索地叙述完毕。在算法层面，本文到二次互反律部分即已经结束了，后面的部分为较为前沿的内容，无需掌握。

写完这四篇基本上可以出版一本初等数论教科书了。

Cipolla平方根算法

由于三次方程的解法较为复杂，开三次方根的算法并不容易。但是在这里有一种简洁有效的开平方根的算法，它需要将研究对象进行域扩张，扩张到 $\mathbb{Q}(\sqrt{a^2-n})$ 上。

对于一个二次剩余 n ，我们想对它开平方根，即求解：

$$\$t^2 \equiv n \pmod p\$$$

考虑方程：

$$\$x^2 - 2ax + n = 0\$$$

这个方程的两根之积是 n ，因此根据Fermat-Euler定理，两根之积的 p 次方应该也是 n ：

$$\${x_1}^p \cdot {x_2}^p \equiv n \pmod p\$$$

注意这里的两个根都未必是整数。下面分别考虑两个根单独的 p 次方是什么，即考虑：

$$\${x_1}^p \pmod p\$$$

如果这个根本身是整数，那么根据Fermat-Euler定理，它的值应当回到这个根本身。

不是整数的情形会怎样？在扩域 $\mathbb{Q}(\sqrt{a^2-n})$ 当中，没有引入 p 分之1作为因子。因此，下面的常见二项式展开结论应当成立：

$$\$(a+b)^p \equiv a^p + b^p \pmod p\$$$

这里的取模是对两个分量1和根号的系数取模。不妨取比较大的根 x_1 （较小的根同理），于是：

$$\${x_1}^p = \{(a + \sqrt{a^2-n})\}^p \equiv a^p + \{(\sqrt{a^2-n})\}^p \equiv a + \{(a^2-n)\}^{p/2} \pmod p\$$$

由于 a 是整数，根据Fermat-Euler定理 a 的 p 次方还是 a ，因此关键在于后面根号部分的 p 次方是多少，这部

分未必满足Fermat-Eular定理。事实上，这一部分不满足Fermat-Eular定理。

根据Euler判别法，根号下的部分的半群阶次方很好计算。在是二次剩余的时候为1，否则二次非剩余的时候为-1。即：

$$\$(a^{2-n})^{\frac{p-1}{2}} \equiv 1 \text{ or } -1 \pmod{p}$$

两边再乘一个这个数的根号就有：

$$\$(a^{2-n})^{\frac{p}{2}} \equiv \sqrt{a^{2-n}} \text{ or } -\sqrt{a^{2-n}} \pmod{p}$$

上文中，根是整数的情形，即根号可以被开出来，那么这里就是二次剩余，右面的根号系数为1，代回原式可以得到p次方后不变的结果，与之前结论吻合。

但是，根不是整数的情形，对应根号下为二次非剩余，这里的同余式右端根号为负，即：

$$\$(\sqrt{a^{2-n}})^p \equiv -\sqrt{a^{2-n}} \pmod{p}$$

因此，在p次方作用下，原方程的两个根交换了位置□

$$\$x_1^p \equiv a - \sqrt{a^{2-n}} = x_2 \pmod{p}$$

换位的前提，是根号下的数为二次非剩余，即这个根号开不出来的情形。

那么这个结论有什么用呢？我们在两边再同乘一个x1□

$$\$x_1^{p+1} \equiv x_1 x_2 = n \pmod{p}$$

发现p+1恰好是偶数，而右边恰好是要开方的整数n□因此最开始的开方值t就应该是：

$$\$t_1 \equiv x_1^{\frac{p+1}{2}} \pmod{p}$$

这就是Cipolla平方根算法。第一步随机出一个a□使得a的平方减n是二次非剩余。然后只需计算x1的二分之p加1次方即可。由于二次剩余和二次非剩余恰好各占总体的一半，一般认为随机一次的a符合条件的概率是50%。

对于四次方根的求解，可以用两次Cipolla算法来解决，也不算困难。然而对于三次方根就麻烦得多。

一一映射情形的求根

这里指当素数p不是tk+1情形的时候□t次方运算在p的缩系中是一一映射。那么这种情形的求根相当容易，甚至不需要用到上文的扩域。

这里仅举个简单的例子作为参考。对于p是3k+2情形的时候，3次方运算是一一对应。我们已知下面的n□要求解x□

$$\$x^3 \equiv n \pmod{p}$$

首先根据Fermat-Eular定理，这个同余式一定是成立的：

$$\$x^{3k+1} \equiv 1 \pmod{p}$$

那么对n作k次方，就有：

$\$ \$ n^k \equiv x^{3k} \equiv x^{-1} \pmod{p}$

那么再来一次数论倒数就完事了。即完整的式子是：

$\$ \$ n^{3k^2} = n^{k(p-2)} \equiv x \pmod{p}$

其实上面的操作，就是缩系循环群里面，取对数之后，对3进行的数论倒数操作，即寻找一个逆映射。我们看到，3乘以3k方是9k方，再减去1之后，恰好是p-1即3k+1的倍数。因此，在缩系循环群的观点下，这样的逆映射就是跑了若干个整循环之后，恰好多跑出了一个幂次。这样类似于不定方程的思想就求解出了逆映射。

同时也看到，当p是tk+1情形的时候，这个映射不是一一映射，那么就不能采用这种办法了。即p是3k+1情形的时候，无法用这种办法开三次方。

Peralta算法开立方

Cipolla算法开平方是一种特别优秀的算法，时间复杂度很低。而这里写出的Peralta算法仍旧属于一种暴力算法，比用原根与对数计算（至少根号量级）要优秀，相对Cipolla算法（对数量级）时间复杂度比较高。

它的思路是这样的。要求解：

$\$ \$ x^3 \equiv n \pmod{p}$

其中p是3k+1形式，即3次方不是一一对应，并且n是三次剩余，即满足Euler判别法：

$\$ \$ n^k \equiv 1 \pmod{p}$

那么对x进行待定系数。考虑全体x的整系数二次多项式：

$\$ \$ y = ax^2 + bx + c$

因此记录y的时候只需记录整数三元组abc即可。利用最开始的方程关系：

$\$ \$ x^3 \equiv n \pmod{p}$

可以对指数模3，即计算多项式的乘法之后，仍旧还是二次三项式，即y的幂还是整数三元组abc对于这样的多项式y也满足Fermat-Euler定理：

$\$ \$ y^{p-1} \equiv 1 \pmod{p}$

即p-1次方 \equiv 3k次方之后，整数三元组abc变为001。那么在这个多项式空间里就有三次单位根：

$\$ \$ y^k \equiv w \pmod{p}$

那么w也是二次三项式 \equiv w的三次方是1，即整数三元组001。

如果随机生成一个y \equiv 即随机生成一组初始三元组abc \equiv 使得w恰好满足w的abc三元组中a和c都是0，即：

$\$ \$ w = bx$

那么根据w的三次方是1，我们计算出的b恰好就是x的数论倒数。

进一步分析表明，这种随机生成y的方法里，最终计算出的w中a和c都是0的概率只有九分之一，即平均随

机九次才能算出一个合格的w[]

当然一个优势是，这种暴力算法是可推广的，即可以轻松推广到任意次数的剩余中，只是时间复杂度会非常高。它退化成二次的形式的时候，其实和上文的Cipolla算法比较接近，相当于Cipolla的弱化版。

三四次剩余的初步介绍

我们看到优秀的Cipolla算法的关键是，在Euler判别法中，二次非剩余的二分之p-1次方恰好回到了-1，即-1是二次单位根。因此，在一开始考察的方程中，做p次方之后x1和x2恰好互换了位置。这是Cipolla算法的关键。

然而，三四次剩余不是这样。问题在于在缩系乘法群当中，三四次单位根并不固定，并非像二次单位根一样一直是-1。

解决这个问题的办法还是扩域。三四次单位根不固定的原因，是因为固定的三次单位根和四次单位根本来就不在考察范围里。因此需要将分圆域添加进来，才能在新范围中实现固定。

之前提到的高斯整环就是四次分圆整环，艾森斯坦整环就是三次（也是六次）分圆整环。

于是在这种情形下引入三次剩余符号和四次剩余符号（Legendre符号），要求符号下方的数必须是新数域中的非分歧本原素数（可推广至Jacobi符号，下方为不含分歧数的本原数），则总有：

$$\begin{aligned} \left(\frac{x_i}{p}\right)_3 &= 0 \text{ or } 1 \text{ or } \frac{-1+\sqrt{3}}{2} \text{ or } \frac{-1-\sqrt{3}}{2} \\ \left(\frac{x_i}{p}\right)_4 &= 0 \text{ or } 1 \text{ or } -1 \text{ or } i \text{ or } -i \end{aligned}$$

0总代表整除（不互素），1代表是三次剩余或四次剩余，-1代表是二次剩余但不是四次剩余，其余均为非剩余。

例如，对于 $3k+2$ 型素数 p 扩充根号三之后仍为新数域中的素数，其中每个原来的整数都是三次剩余，在新数域中由原来的一一对应变为三一对应，因为新数域中完系扩充到了 p 的平方个。于是三次剩余性质不变，每一个原来的整数代入符号之后右端为1。原来的三次单位根只有1一个，现在多了复平面上的两个。

对于 $3k+1$ 型素数 p 扩充根号三之后不为素数，分裂为两个共轭的新素数，原来的三次剩余性质由新素数继承了。这时，原来看似混乱的三次单位根在模新素数的情况下，同余于复平面上的单位根。

综上所述，在扩域后三次或四次剩余符号里面（下方未扩展至Jacobi）欧拉判别法仍然是成立的。

$$\begin{aligned} \left(\frac{x_i}{p}\right)_3 &\equiv a^{\frac{N(p)-1}{3}} \pmod{p} \\ \left(\frac{x_i}{p}\right)_4 &\equiv a^{\frac{N(p)-1}{4}} \pmod{p} \end{aligned}$$

二次Kronecker符号

剩余符号一般分为Legendre符号、Jacobi符号和Kronecker符号，三者为包含关系，前一个是后一个的特例，后一个是前一个的推广。勒让德符号要求下方为非分歧本原素数（二次为正奇素数），雅可比符号要求下方为非分歧本原数（二次为正奇数），而Kronecker符号什么限制都没有。当然，绝大多数剩余都能轻易地推广到Jacobi符号，这是为了计算互反律方便，但是推广到Kronecker符号就很困难。

高次剩余符号要加下角标3、4等等，而二次剩余符号中的下角标2可以省略。如果没有下角标，默认为二次剩余符号。

二次克罗内克符号是一种二次剩余符号。它含有两个变元n和m，对于n和m均是完全积性的。也就是说，如果把n分解为a个数相乘，m分解为b个数相乘，那么n与m的二次克罗内克符号可以分解为相应的ab个二次克罗内克符号的乘积。

$$\$ \$ n = n_1 n_2 \$ \$$$

$$\$ \$ m = m_1 m_2 \$ \$$$

$$\$ \$ \left(\frac{n}{m} \right) = \left(\frac{n_1}{m_1} \right) \left(\frac{n_2}{m_2} \right) \left(\frac{n_1}{m_2} \right) \left(\frac{n_2}{m_1} \right) \$ \$$$

为了介绍初值和定律，还需要借助类似于Gauss整数中的本原数的概念。在这里要给一般的整数定义本原数：

规定2是分歧数。本原数去掉所有的因子2之后除以4余1，而非本原数去掉所有的因子2之后除以4余3，并规定0是本原数。具体来讲：

本原数：……-6, -3, 0, 1, 2, 4, 5, 8, 9, 10, 13, ……

非本原数：……-5, -4, -2, -1, 3, 6, 7, 11, 12, 14, ……

除了0以外，两整数分类相同，乘积为本原数；分类不同，乘积为非本原数。由于-1是非本原数，整数n和-n被分到不同类中。

对于奇素数p就有了它的相伴本原素数：

$$\$ \$ p_0 = \left(\frac{-1}{p} \right) p = \begin{cases} 1 & \text{if } p \equiv 1 \pmod{4} \\ -1 & \text{if } p \equiv 3 \pmod{4} \end{cases} \$ \$$$

相当于通过配正负号，将p强行转换为4k+1形式。

定义以下初值：

只要有1，值就为1。

$$\$ \$ \left(\frac{1}{n} \right) = \left(\frac{1}{m} \right) = 1 \$ \$$$

在n和m都不是正负1的时候，有：

$$\$ \$ \left(\frac{0}{n} \right) = \left(\frac{0}{m} \right) = 0 \$ \$$$

下方为-1的时候，用于区分负数和非负数。

$$\$ \$ \left(\frac{-1}{n} \right) = \begin{cases} 1 & \text{if } n \geqslant 0 \wedge n \neq 1 \\ -1 & \text{if } n < 0 \end{cases} \$ \$$$

而上方为-1的时候，不仅要看负数或非负数，还要看m是否本原数。

当m为正本原数或负非本原数时：

$$\$ \$ \left(\frac{-1}{m} \right) = 1 \$ \$$$

当m为正非本原数或负本原数时：

$$\$ \$ \left(\frac{-1}{m} \right) = -1 \$ \$$$

最后，关于2的结论，上下方是相同的。

$$\$ \$ \left(\frac{n}{m} \right) = \left(\frac{2}{n} \right) = \begin{cases} 0 & n \equiv 0 \pmod{2} \\ 1 & n \equiv 1, 7 \pmod{8} \\ -1 & n \equiv 3, 5 \pmod{8} \end{cases}$$

由于二次克罗内克符号不仅满足完全积性，还满足以下的两个性质，因此可以通过递归的方式简捷地计算二次克罗内克符号。

循环律

当m是正奇数时，固定m与n的二次克罗内克符号是关于n的周期为m的函数。

$$\$ \$ \left(\frac{n}{m} \right) = \left(\frac{n+km}{m} \right)$$

这个性质用于缩小n通过取余数的方法，使得n落入0到m-1之间。

另一个性质是互反律，在下文的二次互反律再介绍。

Gauss引理

将奇素数p的缩系分为前后两个区间：前半个区间是1到二分之p-1，后半个区间是二分之p+1到p-1。

用n乘前半个区间的数，有m个落到了后半个区间，则：

$$\$ \$ \left(\frac{n}{p} \right) = (-1)^m$$

为了下文的证明方便，引入一个模p意义下的除2运算

$$\$ \$ k/2 = \begin{cases} 0 & k \equiv 0 \pmod{2} \\ 1 & k \equiv 1 \pmod{2} \end{cases}$$

接下来再引入一个多项式h需要借助模p意义下的除2运算：

$$\$ \$ h(x) = \prod_{k=1}^{\frac{p-1}{2}} (x^{p-k/2} - x^{k/2})$$

最终乘积展开后，仍旧要对多项式h的指数部分做模p操作，使得最终多项式h次数不超过p-1。

第一步，要计算多项式h在单位根处的值：

$$\$ \$ h(\zeta_p) = \prod_{k=1}^{\frac{p-1}{2}} (\zeta_p^{p-k/2} - \zeta_p^{k/2})$$

我们发现，由于代入的自变量是p次单位根，对指数部分的模p操作不影响最终取值。并且乘积的每一项都是纯虚数，是 $2i$ 或 $-2i$ 乘以对应角度的正弦值，如果规定正弦值全部取正，则它跑遍了所有的正弦值，不重不漏。

于是将注意力集中到辐角，即统计里面出现了多少个 $-2i$ 出现 $-2i$ 当且仅当函数f落到前半个区间，即：

$$\$ \$ k/2 < \frac{p}{2}$$

因此 $-2i$ 的个数恰好就是：前半个区间的数，有多少个乘2之后还落在前半个区间。这个东西很容易让我们联想到这里的Gauss引理。

如果只关注 $-2i$ 中的负号，即关注个数奇偶性，由于总个数 $p-1$ 是偶数，因此两半区间的奇偶性应当相同。

综上，多项式h在该点的值是：

$$\$ \$ h(\zeta_p) = \left(\frac{2}{p} \right)^{\frac{p-1}{2}} (2^{\frac{p-1}{2}} \prod_{k=1}^{\frac{p-1}{2}} \sin \frac{k\pi}{p})$$

分成了辐角和模长两部分。

根据p是奇素数，模8无非就只有1、3、5、7四种情况，简单讨论可以得到：

$$\$ \$ \left(\frac{2}{p} \right)^{\frac{p-1}{2}} = \begin{cases} 1 & p \equiv 1 \pmod{4} \\ i & p \equiv 3 \pmod{4} \end{cases}$$

辐角部分就解决了。

模长部分是多少呢？首先它一定是个正实数。如果我们在复平面单位圆中观察这部分，会发现它是一大堆弦长的乘积。我们之前见过一大堆弦长的乘积：

$$\$ \$ \sum_{k=0}^{p-1} x^k = \prod_{k=1}^{p-1} (x - \zeta_p^k)$$

在式中，代入x等于1，并取模长。那么，等式左边是p，右边是p-1条弦长的乘积。我们要求的模长部分，弦长恰好有二分之p-1条，不重不漏，因此相当于上式的一半。所以模长部分是：

$$\$ \$ 2^{\frac{p-1}{2}} \prod_{k=1}^{\frac{p-1}{2}} \sin \frac{k\pi}{p} = \sqrt{p}$$

综上：

$$\$ \$ h(\zeta_p) = \begin{cases} \sqrt{p} & p \equiv 1 \pmod{4} \\ i\sqrt{p} & p \equiv 3 \pmod{4} \end{cases}$$

观察多项式h

$$\$ \$ h(1+u) = \prod_{k=1}^{\frac{p-1}{2}} ((1+u)^{p-k/2} - (\zeta_p^k)^{k/2})$$

由二项式展开，在对多项式系数模p时，无论除2运算为何值，总有：

$$\$ \$ u^{p-k/2} | ((1+u)^{p-k/2} - (\zeta_p^k)^{k/2}) + 2(k/2)u$$

除2运算乘2会得到k本身。因此：

$$\$ \$ u^{p+1} | h(1+u) - u^{\frac{p-1}{2}} \prod_{k=1}^{\frac{p-1}{2}} (-\zeta_p^k)$$

由威尔逊定理，乘积部分简化为：

$$\$ \$ u^{p+1} | h(1+u) + u^{\frac{p-1}{2}} \frac{1}{(-1)^{\frac{p-1}{2}}} \prod_{k=1}^{\frac{p-1}{2}} (-\zeta_p^k)$$

Gauss和

要想讲解二次互反律，首先必须讲高斯和，从其根源处讲起。

观察三角函数表：

$$\$ \$ \cos \frac{\pi}{5} + \cos \frac{4\pi}{5} = \frac{-1 + \sqrt{5}}{2}$$

$$\$ \$ \cos \frac{2\pi}{5} + \cos \frac{3\pi}{5} = \frac{-1 - \sqrt{5}}{2}$$

$$\$ \$ \cos \frac{\pi}{13} + \cos \frac{3\pi}{13} + \cos \frac{4\pi}{13} + \cos \frac{9\pi}{13} + \cos \frac{12\pi}{13}$$

$\{10\}\{13\}2\pi+\cos\frac{12}{13}2\pi=\frac{-1+\sqrt{13}}{2}$
 $\$ \cos\frac{2}{13}2\pi+\cos\frac{5}{13}2\pi+\cos\frac{6}{13}2\pi+\cos\frac{7}{13}2\pi+\cos\frac{8}{13}2\pi+\cos\frac{11}{13}2\pi=\frac{-1-\sqrt{13}}{2}$
 $\$ \cos\frac{1}{17}2\pi+\cos\frac{2}{17}2\pi+\cos\frac{4}{17}2\pi+\cos\frac{8}{17}2\pi+\cos\frac{9}{17}2\pi+\cos\frac{11}{17}2\pi+\cos\frac{15}{17}2\pi+\cos\frac{16}{17}2\pi=\frac{-1+\sqrt{17}}{2}$
 $\$ \cos\frac{3}{17}2\pi+\cos\frac{5}{17}2\pi+\cos\frac{6}{17}2\pi+\cos\frac{7}{17}2\pi+\cos\frac{10}{17}2\pi+\cos\frac{12}{17}2\pi+\cos\frac{13}{17}2\pi+\cos\frac{14}{17}2\pi=\frac{-1-\sqrt{17}}{2}$

我们发现，每一组有两个等式，分母为 $4k+1$ 型素数，而第一行的分子全部为它的二次剩余，第二行则全部不是。更多的不再枚举，总之全部符合这个规律。

首先，全体余弦值的和（两行等式的和）是-1。这一点非常容易。既然有了和，只需证明差就可以了。以5为例，相当于：

$\$ \cos\frac{1}{5}2\pi-\cos\frac{2}{5}2\pi-\cos\frac{3}{5}2\pi+\cos\frac{4}{5}2\pi=\sqrt{5}$

由于规律与二次剩余相关，引入二次剩余符号 $\left(\frac{\cdot}{p}\right)$ Legendre符号，上面Kronecker符号退化至下方为奇素数的情形），并且将余弦式用单位根表示，就变成：

$\$ \sum_{k=1}^4 \left(\frac{k}{5}\right) \zeta_5^k = \sqrt{5}$

很令人惊讶，等式的左端出现了高斯和。因此，这个规律的本质，就是要计算高斯和的值。

定义多项式 $g(x)$

$\$ g(x)=\sum_{k=0}^{p-1} \left(\frac{k}{p}\right) x^k$

引入 p 次单位根，高斯和就是该多项式在单位根处的值。

$\$ \zeta_p=e^{\frac{2\pi i}{p}}$

$\$ g(\zeta_p)=\sum_{k=0}^{p-1} \left(\frac{k}{p}\right) \zeta_p^k$

因此高斯和是一个具体的数值。

高斯和的平方很好计算，不断地交换求和次序即可。

$$\begin{aligned} & \$ \begin{aligned} g(\zeta_p) & ^2 = \sum_{n=0}^{p-1} \sum_{m=0}^{p-1} \left(\frac{mn}{p}\right) \zeta_p^{m+n} \\ & = \sum_{s=0}^{p-1} \sum_{m=0}^{p-1} \left(\frac{s(m+s)}{p}\right) \zeta_p^s \\ & = \sum_{s=0}^{p-1} \sum_{m=1}^{p-1} \left(\frac{s(m-1)}{p}\right) \zeta_p^s + \sum_{n=0}^{p-2} \left(\frac{n(p-n)}{p}\right) \zeta_p^n \end{aligned} \end{aligned}$$

至此，已经知道在 p 为 $4k+1$ 型素数时，高斯和的值要么是根号 p 要么是负根号 p 了。然而要想证明本节开头发现的规律，仅凭这些是不够的。我们需要将目标锁定到根号 p 排除负根号 p 的情况才行。因此，问题最终归结为“高斯和的符号问题”。

这是关于多项式 g 在 $x=1$ 处取值的结论。交换求和次序：

$$\$ \$ g(x+1) = \sum_{k=0}^{p-1} \left(\frac{k}{p} \right) (x+1)^k = \sum_{k=0}^{p-1} \left(\frac{k}{p} \right) \sum_{r=0}^{p-1} C_k^r x^r = \sum_{r=0}^{p-1} x^r \sum_{k=0}^{p-1} C_k^r \left(\frac{k}{p} \right)$$

约定当下标溢出的时候，组合数值为0。对于给定的r可以看成关于k的多项式。这对于下标模p也成立，并且上述约定0结论不变。

一个有趣的事是，模p意义下：

$$\$ \$ \sum_{k=0}^{p-1} k^r \equiv 0 \pmod{p-1} \text{ or } 0 \pmod{\text{others}}$$

根据欧拉判别法，模p意义下：

$$\$ \$ \sum_{k=0}^{p-1} k^r \left(\frac{k}{p} \right) = -1 \pmod{\frac{p-1}{2}} \pmod{p-1} \text{ or } 0 \pmod{\text{others}}$$

那么先对组合数部分求和，消去k最终就有：

$$\$ \$ x^{\frac{p+1}{2}} | g(x+1) + x^{\frac{p-1}{2}} \frac{1}{\frac{p-1}{2}!} \$ \$$$

这个结论的意思是，多项式g在1+x处，低于二分之p-1次数项的系数均被p整除，二分之p-1次数项的系数为一个阶乘的逆的相反数。

最后，只需要证明这两个多项式是相等的即g就是h的展开。即：

$$\$ \$ g(x) = h(x) \$ \$$$

这需要用到多项式的整除理论。首先我们已经证明了，在一个单位根处的平方相等。

$$\$ \$ \{g(\zeta_p)\}^2 = \{h(\zeta_p)\}^2 \$ \$$$

由于两边都是整系数多项式，必然有整除关系：

$$\$ \$ \sum_{k=0}^{p-1} x^k | (g(x) + h(x))(g(x) - h(x)) \$ \$$$

左边是不可约多项式，因此右边两个因式必有一个被它整除。换句话说：

$$\$ \$ \sum_{k=0}^{p-1} x^k | (g(x) - h(x)) \$ \$$$

$$\$ \$ \sum_{k=0}^{p-1} x^k | (g(x) + h(x)) \$ \$$$

必然有一个成立。当然，由于多项式g也是p-1次，并且不等于左边，两结论有且仅有一个成立。

如果我们将多项式系数采取模p操作，有结论：

$$\$ \$ \sum_{k=0}^{p-1} x^k \equiv \{(x-1)\}^{p-1} \pmod{p} \$ \$$$

设u为x-1即在对多项式系数模p情形下：

$$\$ \$ u^{p-1} | (g(1+u) - h(1+u)) \$ \$$$

$$\$ \$ u^{p-1} | (g(1+u) + h(1+u)) \$ \$$$

有且仅有一个成立。

上文已经证明了：

$\$u^{\frac{p+1}{2}} | h(1+u) + u^{\frac{p-1}{2}} \frac{1}{\frac{p-1}{2}!} \$$

$\$u^{\frac{p+1}{2}} | g(1+u) + u^{\frac{p-1}{2}} \frac{1}{\frac{p-1}{2}!} \$$

结合之前有且仅有一个成立的两个整除式，一路逆推，我们最终证明了：

$\$u^{p-1} | (g(1+u) - h(1+u)) \$$

$\$ \sum_{k=0}^{p-1} x^k | (g(x) - h(x)) \$$

两多项式均不超过 $p-1$ 次，最终只能相等。

二次互反律

根据上面多项式 g 与高斯和的定义，可以证明二次互反律。对于奇素数 $p \mid q$ 模 q 意义下有：

$\$ \left(\frac{p_0}{q}\right) g(\zeta_p) \equiv p_0^{\frac{q-1}{2}} g(\zeta_p) = \{g(\zeta_p)\}^q \equiv g(\zeta_p)^q \equiv g(\zeta_p) \pmod{q} \$$

这个方法也可以用于计算 2 的情形，即辅助定理，模 p 意义下：

$\$ \sqrt{2} \equiv 2^{\frac{p}{2}} = \left(\left(\frac{\sqrt{2}}{2} + \frac{\sqrt{2}i}{2}\right)^p + \left(\frac{\sqrt{2}}{2} - \frac{\sqrt{2}i}{2}\right)^p\right)^{\frac{p}{2}} = \begin{cases} \sqrt{2} & \text{if } p \equiv 1 \pmod{8} \\ -\sqrt{2} & \text{if } p \equiv 3 \pmod{8} \end{cases}$

用文字叙述出来，二次互反律的完整版是这样的：

如果 n 和 m 有一个大于 0，那么当且仅当 n 和 m 都是非本原数的时候 n 与 m 位置互换需要乘 -1；否则只要 n 和 m 有一个本原数 n 与 m 位置互换的二次克罗内克符号函数值相同。

如果 n 和 m 均小于 0，那么当且仅当 n 和 m 都是非本原数的时候 n 与 m 位置互换的二次克罗内克符号函数值相同；否则只要 n 和 m 有一个本原数 n 与 m 位置互换需要乘 -1。

这个定律用于递归，使得从 n 比 m 小的状态开始，通过 n 与 m 交换位置，新的 n 比新的 m 大。这样就可以重复应用循环律，将 n 与 m 都缩小至初值范围内。

可以将计算得到的一部分二次克罗内克符号的值排成表。表的第一行写 n 第一列写 m



表中 0 的位置标蓝了，而对角线对称后不相同的元素标成了黄色，为了更加直观地看到二次互反律。

三次互反律与四次互反律简介

有了前面的铺垫，这部分就简单了。

三四次互反律的主体部分特别简单：非分歧本原数可以直接颠倒。

$$\$ \$ \left\{ \left(\frac{x_1}{x_2} \right) \right\}_k = \left\{ \left(\frac{x_2}{x_1} \right) \right\}_k \$ \$$$

这里的应用范畴是Jacobi符号。如上所见，二次互反律中的Kronecker符号的相应形式都不太一样，因此个人感觉不太可能直接推广到相应的Kronecker符号形式。

与二次互反律一样，除了主体部分，一定还有一个辅助定理，用于处理上方是分歧数的情形。对于二次互反律，就是上方是2的情形作为辅助定理。而三四次互反律的这部分比较复杂，就先不再给出了。

（缺了辅助定理这部分，计算可能会变得较为繁杂呢）

到更难的类域论的部分，阿廷[Artin]为每一个数域上都推广出了相应的互反律，称为阿廷互反律。这就实在太难了，估计即使是数学系也得要博士才会研究，本科和研究生肯定不会去研究这些（所以我当然不会喽）。

p进数中的平方元

事实上纯数学的美感到这里顶多展示了一半，甚至可以说才刚刚开始。接下来的结论更加适合科普。如果愿意写个算法研究一下，其实也无所谓。事实上学算法的话，看到上文的二次互反律就足够了，只是互反律深刻的本质还没有被揭示出来，甚至到今天仍旧是纯数学的最艰深的课题之一。毕竟在Hilbert的23问中，第6个问题就是在任意数域中证明最一般的互反律，即Artin大佬百年前解决的问题。可知，互反律是数论的核心之一。

要想解释上文二次Kronecker符号中，为什么互反律不仅与本原数有关，还与数的正负有关，参考后文三四次互反律只与本原数有关，这点确实令人匪夷所思。那么要想解释这个问题，就不得不提到p进数，以及后文的Hilbert符号，还有前文中二次曲线上的整点问题一起讨论，才能解释清楚。

首先要在p进数中引入类似于二次剩余的概念。根据p进数的定义，即取p的幂次模后能区分的程度作为p进数右侧的数位，模p的幂中的平方元放在p进数中就变为了p进数中相应的平方元。

首先来对比一下整数、有理数和实数中的平方元：

整数的平方元是离散的，分别为0, 1, 4, 9,

有理数的平方元，就是整数平方元之比。

实数中的平方元是全体非负数，并且全体负数都是非平方元。

注意，在这里就出现了负数和非负数的区分。这一点其实很重要。

首先[p进数的书写方法与p进制数相同，但是右边有限，左边无穷，这点已经提到了。

于是，每一个p进数都可以唯一表示为p的n次方乘u的形式。其中u小数点后没有内容，并且小数点前一位非0。

（相当于将p的因子全部提出来）

于是[p进数为平方元的充要条件为[n是偶数，并且u小数点前一位是模p的二次剩余。

这体现了p进数中的平方元具有某种聚集的特征，除了含p偶数条件以外，只与一位有效数字有关，与再左边全没关系。

二次Hilbert符号

二次Hilbert符号中的变元是上方的a和b，范围不仅限于整数，而是要求a和b非零，并且使得a和b有意义的数。

二次Hilbert符号的值域只有1或-1。

考察这条二次曲线。

$$ax^2 + by^2 = 1$$

这条二次曲线在实数范围有没有点？这与a和b的取值有关。因此定义Hilbert符号，看起来像是二次剩余符号的上方变为两个的样子：

$$\left(\frac{a}{b}\right)$$

这个符号下方是无穷，表示实数范围。当a与b存在一个是非负数的时候，取值为1；仅当a和b都是负数的时候，取值为-1。

看起来怎么这么简单？这是因为这里考察的范围是实数。下面转到p进数域，对应这个符号：

$$\left(\frac{a}{b}\right)_p$$

同样考察同一个方程（二次曲线）。

$$ax^2 + by^2 = 1$$

这条二次曲线在p进数范围有没有点？同样与a和b的取值有关。这时，需要将同样的a和b改写为p进数的形式。

$$a = p^i u$$

$$b = p^j v$$

其中p的幂次i和j，要保证u和v在p进数中，小数点后没有内容，小数点前一位非0。这样的表示类似于科学记数法，是唯一的。

于是给出一个表达式r：

$$r = \frac{(-a)^j}{(-b)^i} = \frac{(-u)^j}{(-v)^i} = (-1)^{ij} \frac{u^j}{v^i}$$

那么二次Hilbert符号的计算就有了，直接给出结论。

当p是奇素数时：

$$\left(\frac{a}{b}\right)_p = \left(\frac{r}{p}\right)$$

等式的右端就是一般的Kronecker二次剩余符号，上方的p进数r只取最后一位，代表模p。

当p是2的时候：

$$\left(\frac{a}{b}\right)_2 = (-1)^{\frac{r-1}{8} + \frac{u-1}{2} \frac{v-1}{2}}$$

这里-1的指数是2进数，只取2进数最后一位，代表模2。

那么二次Hilbert符号就有如下性质，用 v 代表素数或无穷符号：

对称性

$$\left(\frac{a}{b}\right)_v = \left(\frac{b}{a}\right)_v$$

完全积性

$$\left(\frac{a}{bc}\right)_v = \left(\frac{a}{b}\right)_v \left(\frac{a}{c}\right)_v$$

化归二次剩余情况

这里 a 为 p 进数中，小数点后没有内容而前一位非0的数。当其中含一个 p 的时候，无论 p 是奇素数还是2：

$$\left(\frac{a}{p}\right)_p = \left(\frac{a}{p}\right)$$

右边就是一般的二次剩余符号，例如二次Kronecker符号。

双可逆元情况

对于奇素数 p 如果 a 和 b 均为 p 进数中，小数点后没有内容而前一位非0的数，就有：

$$\left(\frac{a}{b}\right)_p = 1$$

原因很简单。式子算出 r 的 uv 部分指数 i,j 都是0，因此 r 就是1。

对于2的情况是这样的，如果 a 和 b 均为2进数中，小数点后没有内容而前一位为1：

$$\left(\frac{a}{b}\right)_2$$

当且仅当 a 和 b 都模4余3的时候，值为-1，否则值为1。

到这里，与利用完全积性计算二次Hilbert符号的目标，还差最后一步。

相等数情况

$$\left(\frac{a}{a}\right)_v = \left(\frac{a}{-1}\right)_v$$

当 a 就是下方的素数 p 的时候，代入公式得：

$$\left(\frac{p}{p}\right)_p = \left(\frac{p}{-1}\right)_p = \left(\frac{-1}{p}\right)$$

至此就可以借助完全积性来计算二次Hilbert符号了。

根据方程含义，还可以推出以下初值：

$$\left(\frac{a}{1-a}\right)_v = 1$$

注意定义要求自变量非0，即 a 不能是0或1。

互反律与 p 进数的关系

终于到了最后的部分，也是本篇最精华的部分。

由于上一部分二次Hilbert符号里面直接给出了结论，略去了证明，于是这部分的难度被大大降低了，似乎随便写写就能写明白了。

对于方程：

$$ax^2+by^2=1$$

我们利用下方为无穷的二次Hilbert符号就可以判定它是否有实数解，当然这一步多此一举，直接正负讨论即可。

那么，上面有没有理解呢？结论是这样的：

对于给定的非0有理数a和b， \exists 二次曲线上有有理点，等价于首先有实数点，并且其次对于所有的p进数域中都有点。

那么有理解的判定方法是怎样的？有下面的Hilbert乘积公式。不过先说一个显然的结论：

对于给定的非0有理数a和b， \exists 至多只有有限个p使得a和b的二次Hilbert符号值为-1。

这是因为定义中a和b非0，至多只有有限个p整除a或b，于是对于剩余的p均既不整除a也不整除b，符号的值就为1了。

Hilbert乘积公式

$$\prod_v \left(\frac{a}{b} \right)_v = 1$$

乘积的范围是全体v，即v取无穷以及全体素数。

考虑完全积性的性质以及a和b的素因子分解，只需要对以下三种情形证明即可。

当a和b为相异奇素数时：

$$\begin{aligned} \left(\frac{a}{b} \right)_v &= \begin{cases} \left(\frac{b}{a} \right)_v & \text{if } v \neq p \\ (-1)^{\frac{a-1}{2} \frac{b-1}{2}} & \text{if } v = p \end{cases} \\ &= (-1)^{\frac{a-1}{2} \frac{b-1}{2}} \end{aligned}$$

这种情况Hilbert乘积公式恰好就是二次互反律。

当a为奇素数，b为-1或2时：

$$\begin{aligned} \left(\frac{a}{-1} \right)_v &= \begin{cases} -1 & \text{if } v \neq p \\ 1 & \text{if } v = p \end{cases} \\ &= 1 \end{aligned}$$

$$\begin{aligned} \left(\frac{a}{2} \right)_v &= \begin{cases} -1 & \text{if } v \neq p \\ 1 & \text{if } v = p \end{cases} \\ &= 1 \end{aligned}$$

这种情况Hilbert乘积公式恰好就是二次互反律的补充定律。

当a为-1，b均为-1或2时，这种情形最简单了。

$$\left(\frac{-1}{-1} \right)_v = \begin{cases} -1 & \text{if } v \neq p \\ 1 & \text{if } v = p \end{cases}$$

$$\left(\frac{-1}{2} \right)_v = 1$$

这个乘积公式统一了二次互反律。它的意义就是：对于给定的非0有理数a和b， \exists 不存在有理点的p进数域加

实数域的数量是偶数。

因此验证有理点，只需验证实数域，以及除一个素数以外所有的p进数域即可。

至此，有关互反律的全部内容介绍完毕。完结撒花！

From:
<https://wiki.cvbbacm.com/> - CVBB ACM Team



Permanent link:
<https://wiki.cvbbacm.com/doku.php?id=2020-2021:teams:namespace:%E5%89%A9%E4%BD%99%E5%92%8C%E4%BA%92%E5%8F%8D%E5%BE%8B&rev=1592904750>

Last update: 2020/06/23 17:32