

# 素数幂次问题

## 记号约定

在本文中，采用习惯记号，素数 $p$ 在 $n$ 中的幂次记为：

$$v_p(n)$$

代表 $p$ 的这个幂次恰好整除 $n$ ，而比这个值更高的幂次无法整除 $n$ 。由于“恰好整除”记号（双竖线）容易和C语言“或”运算混淆，故不采用恰好整除记号。

另外一个记号也在后文出现， $p$ 进制下 $n$ 的各位数字和：

$$S_p(n)$$

这个记号不一定要 $p$ 是素数，只是后文的 $p$ 均为素数。

阅读本文时，希望能提前大致了解模 $p$ 的缩系乘法群的相关知识。

## p进制

### 写在前面

因为 $p$ 进数的主体部分是数论一个艰深的分支，这里只阐述 $p$ 进数的初始观点，不做深入研究，仅为了方便理解后文的内容。

$p$ 进制的基础，是 $p$ 进制整数。所有 $p$ 进制下正整数，改写为 $p$ 进制时形式不变。这部分很简单，默认所有人都已经会了。

### 取模的观点

例如二进制数110110和101110。

如果我们模8的话，相当于取这两个数的最后三位，结果都为110。这也就是说，模8意义下无法区分两个数。

而模16的时候，相当于取这两个数的最后四位，分别为0110和1110。这个时候才能区分开两个数。

因此有这种感觉，模4就能区分的两个数，比模16才能区分的两个数，在二进制意义下距离更远。

$p$ 进制重新定义了两个数的距离。如果模 $p$ 的 $a$ 次幂才能够区分两个数，那么这两个数的距离就是1除以 $p$ 的 $a$ 次幂，即写成 $p$ 进制表示后从右往左第几位才开始不同。因此 $p$ 进制表示的数无法像普通实数那样排在一条直线上，即没有通常意义的序关系。

因此，模数为素数幂次时，高幂次模数是对低幂次模数更加细化的划分。这样就理解了 $p$ 进制中更靠左的位数更小，与一般的整数理解恰好相反。

也可以这样理解：多项式除法的时候，既可以使得余式的次数越除越高，也可以使得余式的次数越除越低。这依赖于除法的意义不同，导致除法的方向相反。

由于越靠左的位数表示距离越近，权重越小，因此p进数下的数左边可能会无限长，但右边一定有限长，即小数点后的位数有限。

## p进数下的有理数

第一种解释，就是上述整数的除法。只是这次要求从右往左除。

类比一般的小数，这种解释也表明p进数下的有理数，左边要么有限，要么无限循环。

因为有取模的意义，采用p进数的时候，有理数本身和它的表示一定是一一对应的，而不是像普通的p进制存在一二对应。

例如7进制下， $0.666666\dots$ 和1表示同一个数，即每个有限小数都是一二对应，存在两种表示方法，而7进赋值下 $\dots.666666.0$ 和1表示不同的数，至少在有理数范畴，实际的数与它的表示永远是一一对应的。

上面例子的 $\dots.666666.0$ 事实上表示-1p进数里没有负号。

第二种解释，采用数论倒数。

例如模13意义下，无法区分1/3和9，那么有理数1/3在13进数里最后一位就是9，并且是小数点前一位。如果想知道有理数1/3在13进赋值里倒数第二位是多少，就要求解模169的时候3的倒数是多少，以此类推。

这两种解释完全等价。

采用p进数的时候，小数点后不为0的情况（合法p进赋值数必然有限长），就是有理数分母中存在p的情况。例如0.1表示 $1/p$ 左边无限循环的情况，就是分母中存在非p素因子的情况，也有可能代表负数。

采用p进数方法记录的数，加减乘除的规则都与普通的整数完全相同，只是除法方向相反而已。

因此可以找一个计数方法巧妙记录有理数，例如将1/3就记录成 $\dots.101010101$ 等等，在数论方面的性质仍旧保留了。

## p进数下的无理数

规定，每一个右端有限，左边无限不循环的合法p进数定义一个p进数意义下的无理数。那么全体合法p进数对应全体p进数意义下的实数。

数列的收敛：当且仅当随着p进数数列不断延伸p进数从右往左各位逐一确定（不再改变），则p进数数列收敛于一个p进数。

数列发散于无穷：当且仅当随着p进数数列不断延伸p进数的右边位数不断增长，可以增长到任意位数，则p进数数列发散于无穷。

其余情况为一般的发散（不收敛）。

定义了收敛和发散，自然所有可以收敛到的值，对应全体p进数意义下的实数。也就是说，可以用无穷的p进数有理数数列逼近任一个p进数实数。

p进数意义下的实数与正常的实数不同，往往不存在一一对应关系。一些正常的实数可能不对应于任何p进数意义下的实数，一些p进数意义下的实数也可能不表示任何正常实数。当然，也不保证两者一多对应的存在，因此事实上p进数创造了新的微积分体系。

例如熟悉的指对数计算，采用 $e^x$ 和 $\ln x$ 引入，计算时采用展开成无穷级数的方法。那么很多正常的实数就没办法表示，因为两个无穷级数在p进赋值里存在收敛域（收敛域不难计算），一个普通的x在正常实数范畴可以存在指对数，到p进数里就可能落在收敛域之外。又有可能在正常实数里负数无法计算对数（暂不考虑复数意义下），但是将负数表示为p进数之后可能落在收敛域里，就存在对数。

后文将探讨收敛域问题。

## 升幂定理

### 总述

又叫LTE（Lifting The Exponent）现在统称升幂定理。本来是用于解决p进赋值问题的工具，但是由于它超好用而基础，已经深入到高中竞赛之中。

由于缩系乘法群的结构不同，根据素数为奇素数或2，分为LTEP定理和LTE2定理两部分。

### LTEP

这是p为奇素数的情况。

使用本定理的前提：

第一条 p整除a-b即模p意义下无法区分a和b

第二条 p既不整除a也不整除b即a与b在p进制下末位不为0。

那么 $a^n$ 和 $b^n$ 距离有多近呢？即究竟要取多大的模才能区分 $a^n$ 和 $b^n$ 呢？下面这个公式恒成立：

$$v_p(a^n - b^n) = v_p(a - b) + v_p(n)$$

即贡献分为两部分：原本的距离部分和指数的部分。

### LTE2

这是p为2的情况。

使用本定理的前提：

条件一 a和b都是奇数。

条件二 n为偶数，或者4整除a-b

由于群的结构不同，最终的结论也略有不同。事实上二进赋值与其他的p进赋值的性质不太一样。

$$v_2(a^n - b^n) = v_2(a - b) + v_2(a + b) + v_2(n) - 1$$

贡献实际上也分为两部分：原本的距离部分和指数的部分，只是原本距离部分变复杂了。

条件二比较严格。当4不整除a-b且n为奇数的时候，定理就不适用了，即此时无法借助本定理计

算 $v_2(a^n-b^n)$

## 素数在阶乘中的幂次

一般在解析数论研究中偏爱这个式子，最早是由Gauss研究的：

$$v_p(n!) = \sum_{k=0}^{\infty} \left\lfloor \frac{n}{p^k} \right\rfloor$$

这里推荐使用更加流行而简单的公式，替代上面这个繁杂的式子。它用到了文章开头的p进制下各位数字和：

$$v_p(n!) = \frac{n - S_p(n)}{p-1}$$

与等比数列求和公式很相似。由于涉及各位数字和，利用数学归纳法可以轻松证明。

## p进数的指对数

### 定义

利用展开式定义：

$$e^x = 1 + x + \frac{1}{2}x^2 + \frac{1}{3!}x^3 + \frac{1}{4!}x^4 + \dots$$

$$\ln x = (x-1) - \frac{1}{2}(x-1)^2 + \frac{1}{3}(x-1)^3 - \frac{1}{4}(x-1)^4 + \dots$$

根据上文收敛和发散的定理，利用上面的升幂定理和素数在阶乘中的幂次，可以证得下面的结论。

### p为奇素数

此时的p进数中，仅当被p整除的数可以计算指数，被p除余1的数可以计算对数，即两种运算的收敛域。

### 2进数

在2进数中，仅当被4整除的数可以计算指数，被4除余1的数可以计算对数。这比奇素数时要严格。

（其实所有奇数均可计算对数，均在收敛域内。但是全体被4除余3的数算出来的对数不满足后文的双射条件，算出的对数值再代入指数无法得到原数，而是它的相反数——被4除余1的数，因此不再讨论）

我们可以计算2进数下的 $e^4$ 和 $\ln 5$ 进而直观了解指对数：任意指数都是 $e^4$ 的指数，利用换底公式可以转换成以5为底的对数，从而与前一篇文章缩系乘法群中以5为底的对数对比。

注意，无论奇素数或2的情形 $e$ 和 $\ln 2$ 的相应p进数表示均无法计算，即落在收敛域外，找不到对应的表示。

### 定义的根据与意义

上面的定义依赖展开式，即只与多项式本身有关，不依赖于x的取值。因此，只用多项式理论即可证得，这种定义满足性质：

互反性：用一个嵌套另一个，会得到1。即两种运算互逆。

乘加转换：对于任意的a和b满足：

$$e^{a+b} = e^a e^b$$

$$\ln ab = \ln a + \ln b$$

因此指数定义是完备的。借助公式：

$$a^b = e^{b \ln a}$$

可以定义任意二元幂运算，只要相应变量均落入指数收敛域即可。同时借助换底公式可以计算任意二元对数，也要求落入收敛域。

这里的指数与之前群论的指数有何异同？之前群论中的指数，要求幂次（指数）是普通的整数，只有底数和真数（幂）是取模意义下的。

这里p进制理论中的指数，底数、指数（幂次）和幂（真数）均在p进制中。它建立了一个双射：模p或4余1的乘法，与模p或4余0的加法之间的双射。

## 素数在组合数中的幂次

（一个公式待补充）

如果仔细分析p是否整除组合数其实和上下标在p进制下减法是否需要借位有关。这就有了下面的定理。

（待补充）

## Lucas定理

结合上面“素数在组合数中的幂次”一同分析。上面的部分用于计算当组合数被p整除时，一共能被多少个p整除（仅判断模p的幂是否为0）；而这里则研究当组合数不被p整除时，模p余多少。

（待补充）

至于到算法层面，还有与中国剩余定理结合的扩展卢卡斯算法exlucas用于解决模p的幂的余数问题。由于本文注重数学部分，这里不再讲解。

From: <https://wiki.cvbbacm.com/> - CVBB ACM Team

Permanent link: <https://wiki.cvbbacm.com/doku.php?id=2020-2021:teams:namespace:%E7%B4%A0%E6%95%B0%E5%B9%82%E6%AC%A1%E4%B8%8E%E8%BF%9B%E6%95%B0%E9%97%AE%E9%A2%98&rev=1591432791>

Last update: 2020/06/06 16:39